



Notes d'ornithologie française

Quatrième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France

Philippe J. Dubois, Marc Duquet & Georges Oliosio

Cette nouvelle mise à jour du *Nouvel inventaire des oiseaux de France* (NIOF; DUBOIS *et al.* 2008) a pour objet de mettre en valeur les nouveautés avifaunistiques enregistrées depuis la parution de cet ouvrage de référence et celle des précédentes notes d'ornithologie française (NOF1, NOF2, NOF3; DUBOIS *et al.* 2012, 2014, 2017). L'avifaune française connaît en effet de nombreuses modifications: la plupart concernent des réductions d'aire de répartition ou des chutes d'effectifs, mais d'autres sont plus encourageantes (espèces nouvelles pour la France, augmentation d'effectifs ou nouveaux cas de nidification...). À l'instar des précédentes NOF, cette nouvelle synthèse n'a pas la prétention d'être exhaustive, car elle s'appuie uniquement sur les informations ayant été publiées (dans des périodiques, des ouvrages ou sur Internet) et sur celles qui ont été portées spontanément à notre connaissance par les observateurs français. Continuez à nous signaler les données nouvelles par rapport au NIOF et aux NOF successives, inédites ou non signalées ici, en les communiquant à Philippe J. Dubois (pjdubois@orange.fr). Un grand merci par avance!

LISTE DES OISEAUX DE FRANCE : MODIFICATIONS

Les changements apportés à la Liste des oiseaux de France (LOF) depuis les NOF3 concernent l'ordre des familles qui est fortement modifié, mais aussi la nomenclature générique et spécifique d'un grand nombre d'espèces. L'essentiel de ces modifications et leurs motivations figurent dans les comptes rendus de la Commission de l'avifaune française (CAF) qui sont publiés dans *Ornithos* (DUFOUR *et al.* 2020, 2021). Une grande partie de ces changements ont été pris en compte dans la version la plus récente de la LOF (CAF 2020), dont l'ordre et la nomenclature sont suivis dans ces NOF4, mais certains sont plus récents (DUFOUR *et al.* 2021).

TAXONS NOUVEAUX POUR LA LOF

Catégorie A

Depuis 2017, les taxons suivants ont été ajoutés en catégorie A de la LOF à la suite d'observations récentes en France ou de la révision de données anciennes (l'année indiquée est celle de la première mention acceptée):

- 2006 – Flamant nain *Phoeniconaias minor* (précédemment inscrit en catégorie D; CROCHET *et al.* 2019);
- 2010 – Pélican frisé *Pelecanus crispus* (précédemment inscrit en catégorie D; DUFOUR *et al.* 2019);
- 2011 – Vautour de Rüppell *Gyps rueppelli* (précédemment inscrit en catégorie D puis E; PONS 2018);
- 2014 – Albatros à bec jaune *Thalassarche chlororhynchos chlororhynchos* (FORTIN 2018);
- 2015 – Alouette monticole *Melanocorypha bimaculata* (AUDEVARD 2018), Puffin à bec grêle *Ardenna tenuirostris* (FÉVRIER *et al.* 2022);
- 2016 – Goéland de la Véga *Larus vegae* (CHANSAC 2021), Bergeronnette orientale *Motacilla tchutschensis* (GUILLE 2018), Pouillot de Temminck *Phylloscopus coronatus* (GUILPAIN & VINCENT 2018);



1. Grand Tétrás *Tetrao urogallus*, femelle, Jura, mai 2011 (Thomas Perrier). Female Capercaillie.

- 2017 – Sterne royale *Thalasseus maximus* (PLESTAN & PROVOST 2020), Fauvette babillarde de Sibérie *Curruca curruca blythi* (BOUZENDORF *et al.* 2019), Pouillot oriental *Phylloscopus orientalis* (WROZA 2020);
- 2018 – Pipit (farlousane) de Sibérie *Anthus rubescens japonicus* (CROCHET *et al.* 2021);
- 2019 – Fou brun *Sula leucogaster* (DENIAU & PROVOST 2020), Traquet (motteux) de Seebohm *Oenanthe oenanthe seebohmi* (DÉROZIER 2020), Paruline noir et blanc *Mniotilta varia* (SABATIER 2021), Paruline à gorge orangée *Setophaga fusca* (ISAAC 2020), Paruline couronnée *Seiurus aurocapilla* (WROZA 2021);
- 2020 – Courlis hudsonien *Numenius hudsonicus* (REY 2021).

Voir plus loin pour plus de précisions sur l'occurrence de ces taxons en France.

Catégorie C

Présent en France depuis les années 1970 et nicheur régulier depuis 1990, le Cygne noir *Cygnus atrata* a été inscrit en catégorie C de la LOF.

Taxons supprimés de la LOF

Après réexamen, la CAF a retiré de la LOF les espèces et sous-espèces suivantes : Sterne africaine *Thalasseus albidorsalis*, Grand Pingouin *Pinguinus impennis* (PONS & la CAF 2020), Rousserolle effarvatte orientale *Acrocephalus scirpaceus fuscus* (DUFOUR *et al.* 2020).

LISTE DES OISEAUX DE FRANCE : DONNÉES NOUVELLES

Galliformes – Phasianidae

Grand Tétrás *Tetrao urogallus*

L'espèce est proche de l'extinction en Lozère, où aucune observation n'a été faite en 2020 (BARTHEZ & LEGENDRE 2021). Rappelons que les récentes populations du Massif central résultent d'un programme de réintroduction entrepris de 1976 à 2004 dans le Parc national des Cévennes (NAPPÉE 2008).

Anseriformes – Anatidae

Bernache à cou roux *Branta ruficollis*

Le statut de l'espèce en France a été révisé récemment par la CAF et le CHN : sur les 74 données françaises ayant été réexaminées, 45 ont été admises en catégorie A de la LOF (DUBOIS *et al.* 2021).

Oie cendrée *Anser anser*

Premiers cas de reproduction de l'espèce : en Lozère en 2015, puis en 2016, 2017 et 2020 (BARTHEZ & LEGENDRE 2021); en Côte-d'Or en 2013 et 2014 (un couple), mais pas d'autre reproduction jusqu'en 2017 au moins, malgré la présence du couple (A. Rougeron); et en Brenne, Indre, en 2018 (J. Trotignon).

Cygne noir *Cygnus atratus*

Un couple avec 4 poussins est vu le 27 février 2020 à Saint-Cyprien, Pyrénées-Orientales (G. Escoubeyrou, Faune LR), l'espèce continue sa progression vers le sud.

Cygne tuberculé *Cygnus olor*

Une famille observée le 16 juin 2017 à Saint-Nazaire, Pyrénées-Orientales (C. Bray, Faune LR), représente sans doute du premier cas de reproduction de cette espèce en milieu naturel dans ce département.

Cygne chanteur *Cygnus cygnus*

Depuis sa première nidification enregistrée en 2012 (BENMERGUI *et al.* 2012), le couple installé en Dombes, Ain, a niché avec succès chaque année depuis et un deuxième couple s'est installé en 2016 (*Ornithos* 27-2 : 74-75); en 2019, deux couples supplémentaires s'étaient formés (*Ornithos* 28-1 : 30-31) et en 2020, 5 couples ayant « des vellétés de nidification » étaient présents (*Ornithos* 29-2 : 75). Par ailleurs, au cours de l'été 2020, deux individus étaient également présents en Champagne et deux autres en Loire-Atlantique. L'origine d'un couple accompagné de 3 poussins observé le 10 juin 2020 à François, Deux-Sèvres (M. Béréhouc, Faune France) est quant à elle douteuse et concerne sans doute des oiseaux captifs.

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*

La reproduction a été prouvée à Monteux, Vaucluse, avec l'observation d'un couple accompagné de deux jeunes début juillet 2017 (M.-G. Serie et É. Senes, Faune PACA).

2. Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca*, adulte et poussin, Haut-Rhin, février 2013 (Vincent Palomares). Egyptian Goose.



Sarcelle à ailes bleues *Spatula discors*

Les données françaises de l'espèce postérieures à 1981 ont été réexaminées récemment par la CAF et le CHN : sur les 62 mentions ayant été révisées, 55 ont été admises en catégorie A de la LOF. Le pattern d'apparition naturelle de l'espèce a par ailleurs été précisé, révélant un pic printanier (mars-mai) d'adultes pouvant être vus un peu partout en France, et un pic automnal (septembre-octobre), moins marqué, se manifestant principalement dans l'ouest du pays et concernant majoritairement de jeunes oiseaux ; les observations hivernales et estivales se révèlent être très rares (CROCHET *et al.* 2022).

Canard chipeau *Anas strepera*

Premier cas de reproduction pour la Corse en 2018 sur un étang de la plaine orientale (RECORBET & SIBLET 2018).

Canard pilet *Anas acuta*

La nidification de l'espèce reste extrêmement rare en France : au printemps 2018, un couple s'est reproduit au lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique (S. Reeber) et un autre a tenté de nicher sans succès dans la Somme (*Ornithos* 28-1 : 31). En 2020, deux couples ont été notés dans la Somme, mais aucune reproduction n'a été observée (*Ornithos* 29-2 : 76).

Nette rousse *Netta rufina*


Progression de l'espèce dans les Pays-de-la-Loire : un couple se reproduit depuis le milieu des années 2010 près de Seiche-sur-Loir, Maine-et-Loire (*vide* B. Marchadour) et un couple a niché avec succès (7 jeunes) en 2019 à la station de lagunage de Jard-sur-Mer, Vendée (O. Girard).

Fuligule milouin *Aythya ferina*

Première reproduction prouvée en Corse, où un couple accompagné d'au moins deux poussins a été vu en 2017 sur l'étang de Biguglia, Haute-Corse (LEONCINI 2017).

Fuligule nyroca *Aythya nyroca*

Deux cas de nidification de l'espèce dans l'ouest de la France : un couple s'est reproduit au printemps 2018 au lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique (S. Reeber), et un autre a élevé un jeune en 2021 à l'étang des Landes, Lussat, Creuse (BRUNET 2022) et a de nouveau niché en 2022 (*Ornithos* 29-4 : 251).



3. Fuligule milouin
Aythya ferina, mâle,
Mayenne, avril 2010
(Jean-François Arcanger).
Male Common Pochard.

Fuligule morillon *Aythya fuligula*

Au golf de Canet-en-Roussillon, Pyrénées-Orientales, la reproduction (très méridionale) de l'espèce est régulière depuis 2015 (Faune LR).

Eider à duvet *Somateria mollissima*

Après avoir compté un maximum de 24-25 couples en 1999, la population nicheuse française a été décimée par la marée noire de l'*Erika* en décembre de cette année-là. Depuis 2018, 3-4 couples se reproduisent avec succès sur l'île Dumet, Loire-Atlantique, laissant espérer le retour de l'espèce sur d'autres sites (BORET *et al.* 2020).

Harelda boréale *Clangula hyemalis*

Afflux au cours de l'hiver 2016-2017, avec au moins 115 individus signalés en France, dont plusieurs groupes : p. ex. 10 individus le 16 février 2017 à Bretignolles-sur-Mer, Vendée (D. Robbe), au moins 13 le 27 mars à Saint-Pierre-Quiberon, Morbihan (G. Brindejonc) et jusqu'à 16 le 29 janvier 2017 au large de Merville-Franceville-Plage, Calvados (*vide* J.-P. Marie).

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula*

Nouvelles nidifications de l'espèce dans l'Oise : en 2014 et 2015, des juvéniles non volants ont été observés à Chevières, et en 2016, une femelle avec des poussins a été photographiée par un piège-photo à Pont-Sainte-Maxence (P. Malignat). En Seine-et-Marne, l'espèce continue de nicher plus ou moins régulièrement : un couple en 2018, deux en 2019 et un seul en 2020 (*Ornithos* 28-1 : 33 et 29-2 : 77).

Harle bièvre *Mergus merganser*

Initialement limitée au lac Léman, l'espèce poursuit son expansion entre Alpes et Jura, mais aussi vers le nord (Franche-Comté, Alsace), vers le sud (Isère, Drôme, Hautes-Alpes), et commence à s'installer loin du noyau de population initial : depuis le milieu des années 2010, des couples sont ainsi découverts dans le Massif central (Aveyron, Ardèche), dans les Pyrénées (Ariège) et jusqu'en Bretagne (Morbihan, Ille-et-Vilaine) ; la population française est estimée à 403-538 couples en 2020 (DUCOS 2021).

Érismature à tête blanche *Oxyura leucocephala*

Le statut de l'espèce en France a été révisé récemment par la CAF et le CHN : toutes les données françaises (à l'exception d'une femelle portant une bague colorée photographiée en mai 2016 au lac de Grand-Lieu) ont été maintenues en catégorie A de la LOF (REEBER *et al.* 2022).

Caprimulgiformes – Caprimulgidae**Engoulevent d'Europe** *Caprimulgus europaeus*

Records d'altitude : dans les Alpes-Maritimes, des mâles chanteurs sont entendus jusqu'à 2000 m sur la commune de Saorge le 13 juin 2012 et 2120 m à La Brigue le 20 août 2020 (J. Deffarges).

Un mâle équipé d'un géolocalisateur le 8 juillet 2013 dans la forêt de Fontainebleau, Seine-et-Marne, a hiverné au sud de la forêt tropicale centrafricaine, aux confins de la République démocratique du Congo et de l'Angola, et a été repris à Fontainebleau dans le même filet le 12 juin 2014 (BARADEZ & SÉNÉCAL 2019).

Apodiformes – Apodidae**Martinet à ventre blanc** *Apus melba*

Quelques données d'oiseaux tardifs (Faune France) : 1 individu le 22 novembre 2018 à Pérignat-sur-Allier (G. Le Coz), 3 le 22 novembre 2020 à Beynac-et-Cazenac, Dordogne (C. Bailly), 1 le 24 novembre 2019 à Solutré-Pouilly, Saône-et-Loire (B. Dury), 1 le 30 novembre 2018 à Pommiers, Rhône (F. Dubois) et 1 le 29 décembre 2019 à Saint-Remèze, Ardèche (G. Caillon).



4. Tourterelle des bois
Streptopelia turtur, Tarn, juin
2007 (Christian Aussaguel).
European Turtle Dove.

Martinet pâle *Apus pallidus*

De nouvelles localités ont été découvertes en 2018 dans l'Hérault et le Gard, avec des colonies de petite taille mais peut-être pionnières (G. Gory & T. Thomas, 2019, *Alauda* 87 : 260). L'espèce niche à Bordeaux depuis 2014 (L. Barbaro, Faune France) et, tout près de la frontière orientale, à Genève et aux environs en 2022 (P. Rapin, comm. pers.). Ce martinet peut se reproduire très tard : un jeune volant mal est ainsi observé le 7 novembre 2018 à Port-Vendres, Pyrénées-Orientales (J. Hiard).

L'analyse d'une douzaine d'observations tardives de martinets en France a révélé que presque la majorité d'entre elles concernait des Martinets pâles, alors que certaines avaient été attribuées à des Martinets noirs *A. apus* (REY & DUQUET 2021).

Martinet cafre *Apus caffer*

Du nouveau pour cette espèce africaine qui progresse vers le nord et niche depuis quelques années en Espagne, jusqu'en Estrémadure (parc national de Monfragüe). L'année 2020 fut très bonne pour ce martinet avec l'observation d'un individu (le même ?) les 3 et 15 mai à Leucate, Aude, (Med Migration), puis la présence d'un oiseau, visitant des nids d'Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*, du 14 juillet au 15 août à Minerve, Hérault (Gert Vandezande; *Ornithos* 27-5 : 329). En 2022, un individu était de nouveau présent à Minerve, et fréquentait les mêmes nids d'Hirondelle rousseline qu'en 2020 (sans doute le même oiseau; *Ornithos* 29-4 : 247); dans les deux cas, bien que la présence d'un second individu ait été évoquée, elle n'a pas été prouvée. Il est probable que l'espèce niche prochainement dans l'Hérault, le premier cas de nidification de l'espèce ayant été découvert en 2022 en Haute-Corse, près de l'Île-Rousse (cocheurs.fr) !

Otidiformes – Otididae

Outarde canepetière *Tetrax tetrax*

Les résultats de l'enquête menée en 2016 font état de 2429-2478 mâles chanteurs, soit un léger fléchissement de la population française par rapport aux 2578-2652 mâles dénombrés lors de l'enquête

de 2012 (GENDRE *et al.* 2018). En 2016, la population migratrice du Centre Ouest représentait moins de 13% environ de l'effectif national, tandis que celle de Méditerranée dépassait les 87% (47,4% en Languedoc-Roussillon et 39,1% en PACA).

Cuculiformes – Cuculidae

Coucou geai *Clamator glandarius*

Record d'altitude en période de reproduction : le 2 juin 2021, deux contacts nocturnes à 1300 m, à La Saillagouse, Pyrénées-Orientales (E. Roy, Faune LR).

Pteroclidiformes – Pteroclididae

Ganga cata *Pterocles alchata*

Six individus photographiés le 14 septembre 2019 en Camargue, Bouches-du-Rhône, où la présence de l'espèce est exceptionnelle (P. Foulquier, Faune PACA).

Columbiformes – Columbidae

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur*

En 2017, passage printanier le plus faible jamais enregistré à la pointe de Grave, Gironde, avec seulement 5040 oiseaux (LPO Pointe de Grave).

Les observations hivernales restent rarissimes, cependant plusieurs ont été faites au cours de l'hiver 2020-2021 dans diverses régions de France : par exemple, 11 individus le 15 décembre 2020 à Toulouse, Haute-Garonne; 1 individu du 23 décembre 2020 au 1^{er} janvier 2021 à Concarneau, Finistère (J. Quentel, Faune France); 1 individu du 25 novembre 2020 au 5 février 2021 à Chaudron-en-Mauges, Maine-et-Loire (M. Lesca, Faune France). Attention cependant, cette espèce est parfois détenue en captivité et au moins une observation faite en février 2021 sur l'île de Ré, Charente-Maritime, concernait un oiseau porteur d'une bague plastique. Attention aussi au risque de confusion avec la Tourterelle orientale *Streptopelia orientalis* à cette période de l'année !

Gruiformes – Rallidae

Râle des genêts *Crex crex*

Un effectif de 205-227 mâles chanteurs a été dénombré en France au printemps 2020, soit le double de celui de 2019, avec une présence accrue de l'espèce dans l'est du pays, notamment dans des zones de moyenne montagne – Doubs, Lozère, Alpes-de-Haute-Provence –, mais les basses vallées angevines restent le bastion de l'espèce en France (*Ornithos* 29-2 : 92).

Marouette de Baillon *Zapornia pusilla*

En 2019, dans un contexte d'afflux de l'espèce en Europe de l'Ouest, une recherche ciblée a été effectuée au printemps en Brière, Loire-Atlantique, révélant la présence d'au moins 12 mâles chanteurs (DUBOIS *et al.* 2020); l'espèce sera aussi contactée en juin au lac de Grand-Lieu (2 chanteurs) et en Brenne (1 chanteur), tandis que des chanteurs avaient été entendus en mai dans les Landes et dans la Somme. En 2020, un nid avec un jeune et un œuf est trouvé le 19 juin au bord de l'étang de Capestang, Hérault et Aude (JORIS 2020), et 15-16 chanteurs sont localisés dans la réserve naturelle de la Tour du Valat en Camargue (D. Cohez & J. Birard). Depuis, des prospections nocturnes ciblées ont montré la présence de mâles chanteurs en période de reproduction en d'autres régions, par exemple en Bourgogne, en Brenne, dans le Cantal, la Seine-Maritime, la Manche et, surtout, la basse vallée de la Somme; en France, l'espèce est probablement moins rare qu'il n'y paraît à cette époque et sûrement moins rare que la Marouette poussin *Z. parva*.

Talève sultane *Porphyrio porphyrio*

Un oiseau naturalisé, tué en juin 1880 à Port-la-Nouvelle, Aude, a été trouvé dans une collection privée ; la date laisse supposer une possibilité de reproduction. Cette donnée pourrait être la première mention française de l'espèce.

En 2016, dans le cadre d'un afflux de l'espèce dans la moitié nord de la France, ayant notamment touché la vallée du Rhône et le val de Saône, la Talève sultane a niché pour la première fois en Dombes, Ain, à 350 km au nord de la Camargue (CROUZIER 2017).

De nouvelles observations hors des zones de nidification du littoral méditerranéen : un individu le 4 août 2018 à l'étang des Landes, Creuse (C. Mercier), un le 3 juin 2019 au moins à Château-Arnoux-Saint-Auban, Alpes-de-Haute-Provence (G. Briard, Faune PACA), et un individu tué par une voiture à Azille, Aude, à 35 km au nord-ouest de Gruissan (Y. Borremans, Faune LR). En 2021, un nouvel afflux de grande ampleur (au moins 136 adultes observés) a été noté de juillet à octobre en Dombes, Ain, donnant lieu à de nombreux cas de nidification – 21 familles totalisant 51 jeunes (CROUZIER 2022).

Talève d'Allen *Porphyrio alleni*

Un oiseau de 2^e année tiré en mars 1974 à Narbonne, Aude (*Ornithos* 29-4 : 204) fournit la 5^e mention pour la France, la première pour les marais languedociens.

Gruiformes – Gruidae**Grue cendrée** *Grus grus*

Après une première reproduction prouvée en 1995, la Lorraine accueillait un minimum de 14-17 couples nicheurs en 2016 (SALVI 2017). Quelques observations méridionales anachroniques sont à relever : 2 individus le 9 mai 2018 dans une rizière à Arles, Bouches-du-Rhône (J.-C. Cordara, Faune PACA) et 4 individus en vol vers le sud-ouest le 10 juin 2018 à Poussan, Hérault (M. Péchaud, Faune LR).

Les effectifs migrateurs et hivernants continuent de croître : 268 120 individus en halte migratoire ont ainsi été comptés en novembre 2019 au lac du Der, Haute-Marne, et le nombre total de Grues cendrées en hivernage en France était de 152 332 au cours de l'hiver 2018-2019 et atteignait un record de 176 620 individus en 2021-2022 (A. Deschatres, LPO Champagne-Ardenne).

Si pendant longtemps la réserve naturelle d'Arjuzanx, Landes, est restée le premier site d'hivernage de l'espèce en France, avec par exemple 37 370 individus à la mi-janvier 2019 (SCHMALTZ *et al.* 2019), la Camargue voit ses effectifs augmenter régulièrement depuis le milieu des années 1990 (KAYSER *et al.* 2018), pour atteindre un record de 22 303 individus à la mi-janvier 2021, devançant Arjuzanx qui accueille « seulement » 13 888 individus (MOUSSY *et al.* 2021).

Podicipediformes – Podicipedidae**Grèbe castagneux** *Tachybaptus ruficollis*

Records d'altitude : en juillet 2017, reproduction prouvée (3 poussins) à 2 100 m au lac Bousson, Cervières, Hautes-Alpes, (Y. Bonneau).

Sur l'étang de Vendres, Hérault, les rassemblements postnuptiaux dépassent le millier d'individus (D. Clément, Aude Nature).

Grèbe esclavon *Podiceps auritus*

Un individu le 26 mars 2019 à San Damiano, Haute-Corse (C. Batty) ; l'espèce est d'une grande rareté dans l'île.

Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*

Les effectifs français, historiques et actuels, ont été révisés récemment : après avoir atteint un maximum de 900-1 500 couples en 2012 (non 1 200-2 000 couples comme cela avait été évalué dans l'atlas national ;

5. Grèbe à cou noir
Podiceps nigricollis, adulte
au nid, Brenne, avril 2011
(Fabrice & Laurent Desage).
Adult Black-necked Grebe.



ISSA & MULLER 2015), la population nationale de l'espèce s'avère être en très fort déclin depuis 2017, en lien avec les sécheresses à répétition. Elle est estimée à 520-820 couples en 2017-2018 et seulement 310-460 couples en 2019 (TROTIGNON 2021 ; voir aussi *Ornithos* 28-4 : 280).

Phoenicopteriformes – Phoenicopteridae**Flamant rose** *Phoenicopterus roseus*

En 2017, les oiseaux ont abandonné la colonie du Fangassier, suite aux passages répétés d'au moins un Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* ; quelque 2 500 couples se sont ensuite installés dans les salins d'Aigues-Mortes, Gard (Tour-du-Valat). En 2020, ce sont 20 800 couples qui ont niché sur ce site, produisant 16 300 poussins (*Ornithos* 29-2 : 83-84).

Charadriiformes – Recurvirostridae**Avocette élégante** *Recurvirostra avosetta*

Deux cas de reproduction ont été enregistrés dans les terres à plus de 300 km des côtes : un couple nicheur en 2019 et 2020 à Marliens, Côte-d'Or (LEBLANC *et al.* 2020), et un couple en 2019 en Dombes, Ain (CROUZIER 2020) ; ils constituent des premières régionales, respectivement pour la Bourgogne-Franche-Comté et l'Auvergne-Rhône-Alpes.

Charadriiformes – Charadriidae**Vanneau huppé** *Vanellus vanellus*

Le nombre d'oiseaux hivernant en France a été récemment réévalué à 1,5-1,8 million, soit la moitié de l'estimation faite par les agents de l'ONCFS pour la période 2006-2010 (3,7 millions), une baisse imputable à un effondrement de la population européenne, mais aussi à une nette surestimation des précédents effectifs (ZUCCA 2021).

Pluvier doré *Pluvialis apricaria*

Comme pour le Vanneau huppé, l'effectif hivernant en France, estimé à 1,5 million d'individus pour la période 2006-2010, a été nettement revu à la baisse : 0,7-1,1 million (ZUCCA 2021).

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*

Une femelle nicheuse baguée le 26 juin 2017 à Hyères, Var, par Aurélien Audevard a été contrôlée le 31 mai 2018 sur son nid à Beltringharder Koog, Schleswig-Holstein, à 1300 km de son site de reproduction de l'année précédente. Cette espèce est pourtant réputée assez fidèle à son territoire.

Guignard d'Eurasie *Charadrius morinellus*

Un groupe pré-nuptial de 36 individus, photographié en avril 2018 dans la Marne, constitue un record contemporain pour la région Champagne-Ardenne (C. Morvan ; *Ornithos* 25-3 : 172), tandis que le plus important rassemblement post-nuptial jamais noté en France – 106 individus – est observé le 4 septembre 2019 à Vebron, Lozère (F. Legendre, Faune LR).

Un adulte stationne du 21 juin au 13 juillet 2018 à 2500 m d'altitude dans les Pyrénées-Orientales, dans un secteur où l'espèce a déjà niché (GOR).

Charadriiformes – Scolopacidae**Courlis hudsonien** *Numenius hudsonicus*

Un individu photographié le 20 mai 2020 sur l'île de Sein, Finistère, fournit la première mention française de ce taxon, récemment élevé au rang d'espèce (REY 2021).

Courlis cendré *Numenius arquata*

Considérée comme le bastion français de l'espèce au milieu du XX^e siècle, la Bretagne a perdu près de 90% de ses nicheurs entre 1970 (300 couples) et 2017 (20 couples); bien que ce déclin se soit ralenti récemment, l'avenir du Courlis cendré en Bretagne semble très compromis et l'espèce pourrait disparaître d'ici 10 ou 15 ans (MAOUT 2019).

Barge rousse *Limosa lapponica*

Une femelle ayant hiverné sur l'île de Ré, Charente-Maritime, a migré au printemps 2016 jusqu'à la péninsule du Taïmyr, parcourant quelque 15000 km en 119 jours; son appartenance à la sous-espèce *taymyrensis* n'a pas été établie avec certitude, mais la présence hivernale de ce taxon afro-sibérien, jamais signalé en France, semble possible (ROUSSEAU *et al.* 2021).

6. Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrinus*, mâle, Camargue, mai 2021 (Thomas Perrier). *Male Kentish Plover*.



Ornithos 29-5 : 265-306 (2022)

Combattant varié *Calidris pugnax*

L'hivernage de l'espèce à l'intérieur des terres est un phénomène relativement nouveau et l'effectif de 230 individus à la mi-janvier 2017 au lac du Der-Chantecoq, Marne/Haute-Marne, est tout à fait remarquable (Gaudard *et al.* 2018).

Bécasseau violet *Calidris maritima*

Nouvelles données sur le littoral méditerranéen : aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône, un individu le 5 janvier 2018 (T. Roguet), puis hivernage complet d'au moins un individu du 11 novembre 2018 au 21 avril 2019, et à nouveau un oiseau le 24 novembre 2019, puis du 6 janvier au 5 février 2021 (Faune PACA); dans l'Hérault, un individu le 17 novembre 2019 à Sète (F. Baudat, Faune LR).

Charadriiformes – Glareolidae**Glaréole à collier** *Glareola pratincola*

En 2020, au moins 94 couples ont niché en Camargue; il s'agit de la troisième meilleure année après 2008 (127 couples) et 2012 (109 couples). En revanche, le nombre de jeunes à l'envol (au moins 56) se situe en dessous de la moyenne pour la période 2000-2019 (KAYSER 2021 ; *Ornithos* 29-2 : 94-95).

Charadriiformes – Lariidae**Mouette de Ross** *Rhodostethia rosea*

Un oiseau de 1^{re} année présent du 8 au 12 décembre 2021 à Dunkerque, Nord, constitue la dixième mention française de l'espèce, la précédente datant de février 2014 en Charente-Maritime (*Ornithos* 29-1 : 57).

Goéland d'Audouin *Ichthyaetus audouinii*

Après un premier cantonnement en 2020 sur le banc d'Arguin, Gironde (GRANDPIERRE 2021), un couple s'est reproduit avec succès sur ce site en 2021, donnant un jeune à l'envol (M. Grandpierre).

Un oiseau de 3^e année a été observé le 24 mai 2017 à Fresnes-sur-Marne, Seine-et-Marne, fournissant la première mention pour la région Île-de-France, et l'une des très rares données de l'espèce au nord de la Loire (T. Chansac, Faune-IdF).

7. Glaréole à collier *Glareola pratincola*, adulte, Hérault, mai 2019 (Antoine Joris). *Adult Common Pratincole*.



Ornithos 29-5 : 265-306 (2022)

Goéland marin *Larus marinus*

Première reproduction de l'espèce dans les Pyrénées-Atlantiques, où un couple était installé à Hendaye en 2017 (ALZAGA *et al.* 2018).

Goéland dominicain *Larus dominicanus*

Un oiseau de 4^e année était présent du 19 au 21 mars 2018 au Plessis-Gassot, Val-d'Oise, fournissant la seconde mention française de l'espèce (Ornithos 25-2: 117; Touzé *et al.* 2020).

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides*

En février 2017, des oiseaux de 1^{er} cycle se sont aventurés loin à l'est: un individu du 6 au 8 à Torcy, Saône-et-Loire (Faune Bourgogne) et un autre le 17 à Munchhausen, Haut-Rhin (Faune Alsace). L'espèce, qui n'avait guère dépassé l'Indre jusque-là, a même atteint la Méditerranée, avec un individu du 21 au 27 février 2017 à Berre-l'Étang, Bouches-du-Rhône, une première pour la région PACA (D. Boccabella *et al.*, Faune PACA)

Goéland de la Véga *Larus vegae*

Un individu de 4^e année observé et photographié le 17 novembre 2016 à Charny, Seine-et-Marne, fournit la première mention française de cette espèce asiatique; l'oiseau a été attribué à la sous-espèce nominale (CHANSAC 2021). Cette donnée est seulement la deuxième en Europe, après celle d'un adulte du 10 au 13 janvier 2016 en Irlande.

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Un mâle, bagué en Pologne en 2012, était apparié à une femelle de Goéland argenté *L. argentatus argenteus*, paraissait et semblait cantonné sur les toits du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, au cours du printemps 2017 et jusqu'à début août (F. Jiguet *et al.* Faune IdF).

Goéland de la Baltique *Larus fuscus fuscus*

Un oiseau bagué en Norvège a été vu le 23 septembre 2020 à Luc-sur-Mer, Calvados (GONm Actu n°67).

Sterne royale *Thalasseus maximus*

La présence d'un individu de 2^e année du 6 au 29 juin 2017 près de Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor, puis du 10 au 17 juillet en baie du Mont-Saint-Michel, Manche, fournit la première mention française de ce taxon, récemment élevé au rang d'espèce; cet oiseau avait été bagué poussin dans une colonie de Caroline du Nord, États-Unis, en juillet 2016 (PLESTAN & PROVOST 2020).

Sterne caugek *Thalasseus sandvicensis*

Effectif impressionnant de 10 000 individus le 7 septembre 2020 à la Baisse de Quenin, Salin-de-Giraud, Bouches-du-Rhône (J.-P. Marie, Faune PACA)

Sterne élégante *Thalasseus elegans*

Le premier cas de nidification d'un couple pur en France a été obtenu en 2021 sur l'île de Noirmoutier (GERNIGON *et al.*, à paraître). Également remarquable est la présence de 5 individus en juillet 2022 en Camargue (Ornithos 29-4: 254).

Sterne bridée *Onychoprion anaethetus*

Premières mentions depuis 2016, avec un individu vu en mai 2022 sur l'île de Ré, Charente-Maritime, puis un autre (ou le même) ayant séjourné de fin juin à mi-août 2022 dans la colonie de Sternes pierregarins *Sterna hirundo* de l'île aux Moutons, Finistère (Ornithos 29-4: 255).

Sterne pierregarin *Sterna hirundo*

En Camargue, environ 5200 individus étaient présents les 7 et 8 septembre 2018 à la Baisse de Cinq Cents Francs, Salin-de-Giraud, Bouches-du-Rhône (J.-L. Reuzé et A. Flitti, Faune PACA).

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus*

Des hybrides de cette espèce avec la Guifette noire *C. niger* ont été photographiés récemment en France: un juvénile probable en septembre 2019 en Charente-Maritime (CORBEAU *et al.* 2022); un oiseau de 3^e année et un juvénile en 2021 en Brière (DUBOIS *et al.* 2022).

Charadriiformes – Alcidae**Macareux moine** *Fratercula arctica*

L'impact des tempêtes de février 2014 sur les populations d'alcidés hivernant dans le golfe de Gascogne a été revu à la hausse: 28 745 Macareux moines, 11 800 Guillemots de Troil *Uria aalge* et 1 197 Pingouins tordas *Alca torda*, soit un total de près de 44 000 alcidés, trouvés morts ou affaiblis de la côte basque à la pointe bretonne (YÉSOU 2019).

Procellariiformes – Oceanitidae**Océanite de Wilson** *Oceanites oceanicus*

Depuis 2015, l'espèce est vue chaque année et de façon de plus en plus régulière au large des côtes atlantiques françaises (Ornithos 29-4: 254). L'année 2022 s'apprête à pulvériser le record de 2017 (23 individus), avec près de 70 individus déjà signalés au 1^{er} septembre, du sud Finistère à la Loire-Atlantique (Faune France).

8. Océanite de Wilson *Oceanites oceanicus*, Finistère, juillet 2022 (Gaétan Guyot). *Wilson's Storm Petrel*.



Procellariiformes – Diomedidae**Albatros à bec jaune** *Thalassarche chlororhynchos chlororhynchos*

Un ou deux immatures de 2 ans ont été photographiés le 5 septembre 2014 au large de Belle-Île-en-Mer, Morbihan, fournissant la première mention française de ce taxon, qui niche dans l'Atlantique Sud (FORTIN 2018).

Procellariiformes – Procellariidae**Puffin cendré** *Calonectris borealis*

Un individu de cette espèce atlantique a été photographié le 17 avril 2019 en Méditerranée au large de Carry-le-Rouet, Bouches-du-Rhône (V. et T. Roguet, Faune PACA).

Puffin de Scopoli *Calonectris diomedea*

Un oiseau vu et photographié les 5 et 20 juin 2021 dans l'Atlantique au large de l'île Dumet, Loire-Atlantique, était bien loin de la Méditerranée (J.-L. Dourin *et al.*).

Puffin à bec grêle *Ardenna tenuirostris*

Première et deuxième mentions françaises d'oiseaux identifiés d'après des photographies: un individu le 9 septembre 2015 en baie de Saint-Brieuc, Côtes-d'Armor (Y. Février) et un individu le 7 août 2020 dans le Mor Braz, Morbihan (S. Reyt et S. Roques), l'oiseau des Côtes-d'Armor constitue également la première mention de l'espèce pour le Paléarctique occidental (FÉVRIER *et al.* 2022).

Puffin majeur *Ardenna gravis*

Passage exceptionnel de plusieurs milliers d'individus devant les côtes de l'île d'Yeu, Vendée, dans la matinée du 11 novembre 2016 (HINDERMEYER & PENARD 2019).

Puffin yelkouan *Puffinus yelkouan*

Entre le 16 et le 27 août 2021, 4 oiseaux photographiés au large de l'île d'Hoedic, Morbihan, présentaient tous les critères se rapportant à cette espèce (P.J. Dubois, S. Reyt, S. Roques *et al.*). Leur identification a été confirmée par les experts internationaux consultés. De plus, et à la même époque, 3 autres indi-

9. Puffin cendré *Calonectris borealis*, Finistère, août 2020 (Philippe J. Dubois). *Cory's Shearwater*.



Ornithos 29-5 : 265-306 (2022)



10. Puffin yelkouan *Puffinus yelkouan* (à gauche) et Puffin des Baléares *P. mauretanicus*, Hérault, janvier 2022 (Frank Dhermain). *Yelkouan Shearwater (left) with Balearic Shearwater*.

vidus observés et photographiés appartenait probablement à cette espèce. Il s'agit des premiers cas documentés indiquant la présence de ce puffin au large des côtes atlantiques françaises. Cependant, il existe une forme particulière du Puffin des Baléares – le petit « minorquin » – qui ressemble fortement au Puffin yelkouan (GENOVART *et al.* 2012), et même si son identification n'est pas parfaitement maîtrisée et que ses effectifs sont extrêmement faibles (quelques centaines d'individus?), on ne peut, en l'état actuel des connaissances, totalement exclure la présence de ce type d'oiseau dans l'Atlantique.

Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus*

Un effectif record de 6 400 individus a été noté le 7 août 2020 dans le Mor Braz, au large de l'île d'Hoedic, Morbihan (REY & YÉSOU 2021).

Ciconiiformes – Ciconiidae**Cigogne noire** *Ciconia nigra*

À Organbidexka, Pyrénées-Atlantiques, un effectif total de 1 027 individus lors de la migration postnuptiale 2017 constitue un record (LPO Aquitaine).

Suliformes – Sulidae**Fou à pieds rouges** *Sula sula*

Un subadulte de forme intermédiaire observé le 26 juin 2017 aux Sept-Îles, Côtes-d'Armor, fournit la deuxième mention française de l'espèce (PROVOST 2017).

Fou brun *Sula leucogaster*

Première, deuxième et troisième mentions pour la France: un adulte le 30 août 2019 aux Sept-Îles, Côtes-d'Armor (DENIAU & PROVOST 2020); un oiseau de 3^e année présent du 5 avril au 5 juin 2022 sur l'île Saint-Féréol, Cannes, Alpes-Maritimes (*Ornithos* 29-3: 182); un individu photographié au nord d'Hoedic, Morbihan, le 18 août 2022 (L. Clavaz, Faune Bretagne).

Ornithos 29-5 : 265-306 (2022)

Suliformes – Phalacrocoracidae**Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis***

Présence exceptionnelle de cette espèce marine dans les terres : un oiseau de 1^{re} année (sous-espèce type), bagué au cours de l'été 2019 sur l'île de May en Écosse, a été découvert le 25 décembre 2019 en pleine ville de Reims, Marne (A. Cubaixo ; *Ornithos* 27-1 : 65), d'où il n'est jamais reparti ; en effet, il y était encore début octobre 2022, désormais en plumage adulte (Faune France).

Un adulte nicheur de la sous-espèce méditerranéenne *desmaretii* (Cormoran de Desmarest), bagué le 15 mars 2019 sur l'île de Minorque, Baléares, a été contrôlé le 1^{er} novembre 2019 à Argelès-sur-Mer, Pyrénées-Orientales (S. Bouget, Faune LR).

Pelecaniformes – Threskiornitidae**Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus***

En 2017, 3 individus ont été observés le 20 novembre à Roquebrune-sur-Argens, Var (G. Pullino, Faune France), et 11 le 13 décembre à Villeneuve-Loubet, Alpes-Maritimes (H. Claude, Faune PACA) ; il s'agit vraisemblablement d'oiseaux en provenance d'Italie, où l'espèce se développe, car à cette époque la population camarguaise avait été réduite à un seul individu, présent aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône. En mai 2021, 5-6 individus, certains montrant des comportements reproducteurs, étaient de nouveau présents en Camargue, Bouches-du-Rhône (Faune France).

Ibis chauve *Geronticus eremita*

Première mention insulaire et premier cas d'hivernage de l'espèce en Corse, où 4 juvéniles nés en liberté dans la province d'Udine, dans le nord-est de l'Italie, ont séjourné de fin novembre à fin décembre 2017 à Sagone, Corse-du-Sud ; un seul individu hivernera sur ce site jusqu'au 26 mars 2018, tandis qu'un autre est vu à Macinaggio, Haute-Corse, en mars 2018, puis près de Lucciana en mai. Ces oiseaux sont originaires d'un programme de réintroduction italien, qui a également pour but de faire hiverner les oiseaux en Toscane (SEGUIN *et al.* 2019). Par ailleurs, depuis 2020, des oiseaux originaires du programme de réintroduction autrichien sont régulièrement observés en période internuptiale dans le Var et les Alpes-Maritimes (Faune France).

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*

En 2020, la population française comptait 3 597 couples, dont 2 290 en Camargue gardoise (*Ornithos* 29-2 : 82), où un programme de baguage est en cours – plus de 3 500 juvéniles ont été bagués entre 2006 et 2017 (H. Touzé). Avec 107 couples au printemps 2020, la population du lac de Grand-Lieu, Loire-Atlantique, a doublé par rapport à 2019 et triplé depuis 2018 (S. Reeber).

Spatule blanche *Platalea leucorodia*

Découverte en 2019 d'une colonie de 10 couples à Peyriac-de-Mer dans l'Aude, premier cas pour la région Occitanie après celui d'un couple isolé sur l'étang de Vendres, Hérault, en 2018 (CLÉMENT 2020). Le nombre de couples progresse vite : 17 en 2020, 20 en 2021 et 22 en 2022 (D. Clément *in litt.*).

Pelecaniformes – Ardeidae**Butor étoilé *Botaurus stellaris***

Un recensement précis des nicheurs français, effectué en 2021, indique une population de 130-150 mâles chanteurs, traduisant une chute de 50% des effectifs par rapport à 2012 (274-289 mâles chanteurs) ; les bastions de l'espèce restent la Brière, Loire-Atlantique (31-36 chanteurs) et la Camargue (54-60 chanteurs, Camargue gardoise incluse), tandis que les étangs lorrains (14-16 mâles) sont la seule zone intérieure abritant plus de 10 chanteurs (TROTIGNON 2022).



11. Crabier chevelu *Ardeola ralloides*, adulte, Hyères, Var, avril 2012 (Aurélien Audevard). *Adult Squacco Heron*.

Crabier chevelu *Ardeola ralloides*

Un oiseau précoce le 5 mars 2021 au Puy-Sainte-Réparate, Bouches-du-Rhône (S. Brook, Faune France).

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis*

En 2020, un effectif nicheur remarquable de 6 000 couples, dont une colonie de 2 000 couples, a été dénombré dans les Deux-Sèvres (M. Fouquet *vide* P. Yésou). Suspectée dès 2012, la reproduction de ce héron en Corse a été prouvée en 2016 sur l'île de San Cipriano, Zonza, Corse-du-Sud, où 28 nids étaient dénombrés en 2019 (*Alauda* 88 : 139-143).

Héron cendré *Ardea cinerea*

Le recensement des effectifs effectué en 2014 (et publié 7 ans plus tard...) a permis de comptabiliser un minimum de 29 000 couples, soit une diminution de 8,2% par rapport à 2007 ; il s'agit de la première baisse des effectifs depuis le recensement de 1985 (MARION 2021).

Grande Aigrette *Ardea alba*

Une première preuve de reproduction a été obtenue au printemps 2018 en Brenne, Indre (J. Trotignon).

Accipitriformes – Pandionidae**Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus***

Une femelle originaire de Corse est venue nicher dans les Landes en 2019 (*Rapaces de France* 21 : 20). En 2022, un couple s'est reproduit non loin de Rennes, Ille-et-Vilaine, fournissant la première mention de nidification pour la Bretagne (M. Monvoisin, O. Raoux, J. Villiermet *et al.*).

Accipitriformes – Accipitridae**Élanion blanc *Elanus caeruleus***

L'espèce poursuit son expansion en France. Première reproduction : en 2016 en Ille-et-Vilaine, dans le Cher et en Charente ; en 2017 en Vendée et dans le Nord ; en 2018 en Haute-Vienne et Charente-Maritime ; en 2019 dans le Pas-de-Calais (CANNESON *et al.* 2020) et l'Aude ; et en 2020 dans le Finistère, en Indre-et-Loire, dans le Loir-et-Cher, la Marne et l'Aube (plus une tentative dans les Alpes-de-Haute-Provence). De nouveaux cas sont signalés en Lozère en 2014, 2015 et 2016 (LEGENDRE 2017). Reproduction possible au printemps 2017 dans la région d'Étrœungt, Nord, où un adulte et deux juvéniles sont vus à l'automne 2017 (D. Haubreux). En 2020, les effectifs français se situent entre 604 et 986 couples nicheurs, la quasi-totalité dans le tiers sud-ouest du pays (ISSA 2021). En Auvergne, où l'espèce n'avait encore jamais niché, 15 à 20 couples cantonnés ont été recensés en 2021, dont 13 ont niché avec succès (R. Riols, *Ornithos* 28-5 : 327). Dans les Deux-Sèvres, 33 couples ont niché en 2020 (M. Fouquet *fade* P. Yésou).

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus*

Correctif : l'année de la donnée publiée dans le NIOF d'un individu tué sur l'île d'Oléron, Charente-Maritime, était erronée, l'oiseau ayant été abattu dans les années 1840 et non en 1936 (BELTREMIEUX 1884). En 2020, 69 couples territoriaux, donnant 27 jeunes à l'envol, ont été recensés en France, traduisant la progression constante de l'espèce dans les Alpes, le Massif central et les Pyrénées ; la situation est à l'inverse de plus en plus critique en Corse, où il ne reste que 4 couples (contre 10 en 2009), qui ne parviennent plus à élever des jeunes, mettant en péril la survie de l'espèce sur l'île (*Ornithos* 29-2 : 85-86).

12. Aigle botté *Hieraetus pennatus*, 1^{re} année, Crau, Bouches-du-Rhône, mai 2015 (Christian Aussaguel). 1st-cy Booted Eagle.



Espèces / Périodes	1979-1982	2000-2002	2014-2017
Bondrée apivore <i>Pernis apivorus</i>	8 000-12 000	10 600-15 000	18 400-24 600
Circaète Jean-le-Blanc <i>Circaetus gallicus</i>	800-1 100	2 400-2 900	8 400-13 300
Épervier d'Europe <i>Accipiter nisus</i>	11 800-20 000	26 600-42 600	37 000-46 000
Autour des palombes <i>Accipiter gentilis</i>	3 000-4 500	4 600-6 500	7 800-10 800
Busard des roseaux <i>Circus aeruginosus</i>	776-1 000	1 600-2 200	3 000-9 100
Busard Saint-Martin <i>Circus cyaneus</i>	2 800-3 800	7 800-11 200	9 400-13 000
Busard cendré <i>Circus pygargus</i>	3 500-4 400	3 900-5 100	3 600-6 600
Milan royal <i>Milvus milvus</i>	2 300-2 900	3 000-3 900	5 900-10 400
Milan noir <i>Milvus migrans</i>	5 800-8 000	19 300-24 600	38 300-51 000
Buse variable <i>Buteo buteo</i>	45 000-55 700	125 000-163 000	181 400-213 100
Faucon crécerelle <i>Falco tinnunculus</i>	42 000-57 000	72 500-101 000	86 500-100 300
Faucon hobereau <i>Falco subbuteo</i>	1 500-2 300	6 400-10 900	13 900-18 800

tab. 1. Estimation des effectifs (nombre de couples nicheurs) de rapaces diurnes non rupestres en France au cours de la période 2014-2017, PONTARLIER 2019) et rappel des résultats des enquêtes précédentes - 1979-1982 (THIOLLAY & TERRASSE 1984) et 2000-2002 (THIOLLAY & BRETAGNOLLE 2004). Variation of the estimated numbers of breeding pairs of raptors (except cliff-nesting species) in France.

Vautour percnoptère *Neophron percnopterus*

En 2020, 89 couples ont été recensés en France, ce qui traduit une stabilité parfaite des effectifs depuis 2018 (*Ornithos* 29-2 : 86-87). Première mention de l'espèce dans l'Yonne, où un individu né en 2017 dans le Gard a séjourné du 21 juillet au 29 août 2020 près d'une porcherie à Joux-la-Ville (*Ornithos* 27-6 : 380).

Vautour de Rüppell *Gyps rueppellii*

Les données françaises ont été révisées récemment par le CHN et la CAF et trois d'entre elles ont été attribuées à des oiseaux sauvages, plaçant l'espèce en catégorie A de la LOF : un adulte vu au printemps 2011 dans les Alpes-de-Haute-Provence et la Drôme (PONS 2018) ; un subadulte observé en août-septembre 2013 dans les Alpes-Maritimes les Alpes-de-Haute-Provence et l'Aveyron ; un subadulte vu dans en juin et juillet 2017 dans les hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques (PONS *et al.* 2022). Cependant, un individu photographié le 19 mars 2017 en Lozère (LPO Grands Causses) ne figure pas dans cette révision.

Vautour fauve *Gyps fulvus*

L'espèce poursuit sa progression, avec 2 463 couples nicheurs en 2019 en France (*Ornithos* 29-2 : 87-88).

Vautour moine *Aegypius monachus*

La population française est passée de 40 couples en 2018 à 54 en 2019. En 2020, 53 couples étaient recensés : 33 dans les Grands Causses, 15 dans la Drôme et 5 en région PACA (*Ornithos* 29-2 : 88).

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus*

Nouveau record journalier pour un site migratoire français : 1 133 individus dénombrés le 12 mars 2016 à Ille-sur-Têt, Pyrénées-Orientales (A. Fonteneau et G. Escoubeyrou, GOR).

Aigle botté *Hieraetus pennatus*

L'hivernage de l'espèce en France progresse : en dehors de la Camargue, des cas sont signalés en Charente-Maritime, sur le littoral niçois, dans le couloir garonnais et surtout en Languedoc-Roussillon, où l'importance des effectifs est corrélée à celle de la rétro-migration automnale et où jusqu'à plus de 50 individus peuvent hiverner (C. Riols et R. Nadal, *Rapaces de France* 19).

Les effectifs nicheurs français, estimés à 380-650 couples lors de l'enquête 2000-2002 (FOMBONNAT 2004) et réévalués à 585-810 couples en 2012 (THUREL *et al.* 2013), sont probablement encore sous-estimés. En effet, le nombre de couples nicheurs en région Occitanie s'élève à 500 couples (*Rapaces de France* 21).



13. Milan royal *Milvus milvus*, adulte, Espagne, septembre 2020 (Fabrice & Laurent Desage). Adult Red Kite.

Aigle ravisseur *Aquila rapax*

Un individu de 1^{re} année a été photographié le 17 août 2019 au col du Soulor, Hautes-Pyrénées; son origine n'a pu être précisée, mais il présentait une marque sur l'aile indiquant une intervention chirurgicale, ce qui a conduit la CAF à le placer en catégorie E de la LOF (GRANGÉ & WENTWORTH 2022).

Busard des roseaux *Circus aeruginosus*

Un passage important a été noté au printemps 2018 à Prunete-Cervione, Haute-Corse, avec un total de 2074 individus (G. Caucau *et al.*, coches.fr).

Busard pâle *Circus macrourus*

Premier cas de reproduction d'un couple pur au printemps 2020 dans un secteur agricole du Pas-de-Calais, où le couple a mené 4 jeunes à l'envol (CAVITTE & BOUTROUILLE 2021), tandis qu'en Champagne, un autre mâle participait à l'élevage d'une nichée de Busard cendré *C. pygargus* (ROUX 2021).

Mise en évidence d'un passage printanier important sur la côte orientale de la Corse, où 52 individus ont été comptés entre le 26 mars et le 7 mai 2018 à Prunete, Haute-Corse (G. Caucau *et al.*, coches.fr). Sur ce même site, les effectifs comptés de la dernière décade de mars à la première de mai étaient de 68 individus en 2020, 53 en 2021 et 62 en 2022 (Trekellen, www.trekellen.nl).

L'hivernage de 2-3 individus a été observé en France entre 2015-2016 et 2019-2020, dont un mâle qui a été présent durant quatre hivers consécutifs en Camargue (M.-A. Réglade).

Milan royal *Milvus milvus*

Un couple nicheur depuis 2018 dans les Hautes-Alpes (P. Saulay et A. Hugues, *Milan Info* 38-39) fournit le premier cas pour la région PACA. Une femelle, nicheuse dans les Hautes-Pyrénées, et munie d'un GPS, a effectué trois allers-retours en 22 mois entre cette région et le Puy-de-Dôme (secteur de La Bourboule), interrogeant sur son origine et une possible philopatrie (*Rapaces de France* 22).

En migration postnuptiale 2017, 19 400 individus ont été observés sur les trois principaux cols pyrénéens, dépassant largement le précédent record de 2016 et ses 14 000 individus (R. Riols et J.-P. Urcun, *Rapaces*

de France 20). Un autre record a été enregistré en 2019 au Crêt des Roches, Doubs, où 12 026 individus ont été dénombrés lors de la migration postnuptiale. À noter que plus de 10 000 Milans royaux passent chaque automne au défilé de Fort-l'Écluse, Haute-Savoie, faisant de ce site un des plus importants d'Europe (X. Birot-Colomb, LPO Haute-Savoie).

L'hivernage de l'espèce est en forte progression en France : 11 891 individus en janvier 2018, 14 487 en janvier 2020 et au moins 16 608 en janvier 2022. Début 2022, les départements qui accueillent le plus d'individus hivernants sont le Cantal (3 643), les Pyrénées-Atlantiques (3 311) et les Hautes-Pyrénées (2 392), l'hivernage se faisant principalement selon une diagonale Colmar-Biarritz (Réseau Milan royal).

Milan noir *Milvus migrans*

Au total, 14 000 individus sont passés le 7 août 2017 par le col d'Organbidexha, Pyrénées-Atlantiques, constituant un record national (LPO Aquitaine).

Première preuve de reproduction de l'espèce en Normandie : 2 adultes et 2 jeunes à peine volants observés fin juin 2020 à Tournedos-sur-Seine, Eure (GONm Actu n°65).

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla*


En Champagne, les observations de l'espèce en période de nidification ont augmenté à partir de 2010, mais il a fallu attendre 2019 pour assister à une reproduction réussie et à l'envol de deux jeunes; le même succès est noté en 2020 (FAUVEL & BROUILLARD 2021).

Buse pattue *Buteo lagopus*

Cette espèce n'est pas observée tous les ans dans le Midi méditerranéen : un individu le 9 décembre 2017 à Saint-Gilles, Gard (C. Souc, Faune LR) et un oiseau de 1^{er} hiver du 11 décembre 2017 au 6 janvier 2018 à Villeveyrac, Hérault (G. Picotin *et al.*, Faune LR)

Buse des steppes *Buteo buteo vulpinus*

La révision récente des mentions françaises par le CHN a abouti au rejet de toutes les données à l'exception de celle d'un oiseau collecté le 5 mai 1985 à Verneuil-sur-Vienne, Haute-Vienne (JIGUET *et al.* 2020).



14. Milan noir *Milvus migrans*, adulte, Espagne, mai 2022 (Marc Duquet). Adult Black Kite.

Strigiformes – Strigidae**Chevêchette d'Europe** *Glaucidium passerinum*

L'espèce poursuit sa progression hors de ses bastions traditionnels, avec le premier cas de reproduction en Lozère en 2020 (GUÉRIN *et al.* 2021), département où l'espèce avait été notée pour la première fois en 2016 (GUÉRIN *et al.* 2017). Première mention de l'espèce en 2017 en Champagne, avec un mâle chanteur en Haute-Marne (BROUILLARD 2018). Découverte de l'espèce dans le Mâconnais en 2018 (MASSON & MASSON 2019), second site pour le département de la Saône-et-Loire, après le Morvan en 2012 (DÉTROIT 2017). Parallèlement, des individus s'aventurent toujours plus loin des zones de reproduction connues : un oiseau affaibli a ainsi été recueilli et photographié le 30 septembre 2019 près de la gare d'Évry-Courcouronnes, Essonne (A. Mehadji), puis rapidement relâché, fournissant la première mention pour l'Île-de-France ; un individu a été capturé le 5 septembre 2017 à Sion, Meuse (Lorraine-Nature) et un autre a été vu le 22 avril 2017 à Serqueux, Haute-Marne (Y. Brouillard).

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus*

Un chanteur en février et décembre 2020 dans l'Aude, à 535 m d'altitude (M. Vaslin, Faune LR).

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo*

L'espèce progresse vers l'ouest : elle s'est installée dans le Nord-Pas-de-Calais ; un couple a été découvert en juin 2021 dans les falaises du pays de Caux, Seine-Maritime (*Le Petit Cormoran* n°242). En 2022, au moins un couple nicheur en Île-de-France, premier cas régional (S. Wroza, comm. pers.).

Coraciiformes – Coraciidae**Rollier d'Europe** *Coracias garrulus*

Données tardives : un oiseau de 1^{re} année les 5 & 7 novembre 2019 à Vauvert, Gard (J.-P. Trouillas, Faune LR) et un individu le 26 décembre 2019 à Saint-Gilles, Gard (A. Faure, Faune LR) ; ces deux données concernent peut-être le même individu, les deux sites étant distants de 12 km seulement et la description de l'oiseau de Saint-Gilles (présence de « stries sur le cou ») indiquant également un jeune de l'année.

Coraciiformes – Meropidae**Guêpier d'Europe** *Merops apiaster*

Passage remarquable à Prunete, Haute-Corse, où près de 8 200 oiseaux ont été comptés au printemps 2018 (G. Caucau *et al.*, coches.fr) et environ 10 000 individus en 2014 (G. Peplinski), ce qui en fait un site migratoire majeur pour l'espèce en France. Deux petites colonies sont découvertes en 2016 dans l'Oise, dans la région de Beauvais et de Senlis (P. Malignat), une première départementale.

Piciformes – Picidae**Torcol fourmilier** *Jynx torquilla*

En Picardie, un repli de l'espèce vers le sud est noté : bien présent dans les forêts de l'Oise (Compiègne, Retz, Hez, Ermenonville et Chantilly) dans les années 1990, il en a quasiment disparu depuis ; l'espèce niche encore dans la Brie et la vallée de la Marne (P. Malignat).

Pic mar *Dendrocopos medius*

L'espèce poursuit sa progression en Languedoc-Roussillon : dans les Pyrénées-Orientales, première observation départementale le 11 juin 2020 à Prades (GOR) et présence de 2 individus (couple ?) manifestant un comportement territorial le 3 février 2021 à Rabouillet (F. Olivier, Faune France) ; dans l'Aude et l'Hérault, où les premiers cas de reproduction ont été signalés respectivement en juin 2018 à Montjardin (S. Tillo, Faune France) et en juin 2019 à Ceilhes-et-Rocozels (F. Legendre, Faune France).

15. Torcol fourmilier
Jynx torquilla, Rajasthan,
Inde, novembre 2019
(Philippe J. Dubois).
Eurasian Wryneck.

**Pic cendré** *Picus canus*

Un très rare cas d'erratisme signalé le 23 avril 2020 à la pointe de Grave, Gironde, avec un oiseau en déplacement actif (*Ornithos* 27-5 : 328) ; l'espèce n'avait pas été observée en Aquitaine depuis 2004 (Dordogne, LPO Aquitaine), les nicheurs les plus proches se situant en Charente-Maritime.

Falconiformes – Falconidae**Faucon crécerellette** *Falco naumanni*

Deux données pré-nuptiales très excentrées : un mâle le 8 avril 2017 au Cloître-Saint-Thégonnec, Finistère (F. Enault, Faune Bretagne) et un mâle adulte accompagnant des Faucons kobez *F. vespertinus* en mai 2020 à Damprichard, Doubs, première mention pour la Franche-Comté (*Ornithos* 27-4 : 271). Recensement post-nuptial 2017 : 1 017 individus dénombrés en Occitanie et PACA le 30 août, journée de recensement des sites habituels (LPO Aude).

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus*

Un passage record est noté à Saint-Nazaire, Pyrénées-Orientales, au printemps 2017 avec un total de 2 424 individus (A. Chaillou, GOR).

Faucon kobez *Falco vespertinus*

Passage de 126 oiseaux le 4 mai 2018 et de 252 individus le 23 avril 2020 à Prunete, Haute-Corse (G. Caucau *et al.*, coches.fr), confirmant le rôle de la Corse pour la migration pré-nuptiale de l'espèce.

Faucon hobereau *Falco subbuteo*

Un oiseau précoce le 18 février 2017 à Trigance, Var, à près de 1 000 m d'altitude (E. Rocha, Faune PACA)

Faucon sacre *Falco cherrug*

Un mâle de 1^{re} année a été trouvé mort en octobre 2018 à Saint-Laurent-de-Trèves, Lozère. Cet oiseau avait été recueilli affaibli le 24 août près de Stuttgart, Allemagne, conduit dans un centre de soins et relâché le 25 septembre à Mössingen, après avoir été équipé d'une balise. Grâce à celle-ci, on sait que ce jeune faucon est arrivé le 29 septembre dans les Cévennes et qu'il est probablement mort le 9 octobre. Son origine (lieu de naissance) est inconnue et des analyses sont en cours sur un échantillon de peau pour le déterminer. La cause de la mort pourrait être une prédation par le Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* ou l'Aigle royal *Aquila chrysaetos* (R. Nadal, Faune France).

Faucon pèlerin *Falco peregrinus*

En Bretagne, où l'espèce avait disparu au début des années 1960 puis fait son retour en 1995, les effectifs croissent de façon spectaculaire, avec près de 80 couples en 2019 et l'installation de l'espèce en priorité sur les falaises maritimes mais aussi, de façon croissante depuis 2010, dans des carrières à l'intérieur des terres (COZIC 2019).

Psittaciformes – Psittaculidae**Perruche à collier** *Psittacula krameri*

Un effectif de 2 610 individus a été dénombré au dortoir le 15 décembre 2020 à Roubaix, Nord, signant probablement une forte augmentation de la population locale (M. Delaire, C. Beaudoin *et al.*, SIRF).

Passeriformes – Laniidae**Pie-grièche écorcheur** *Lanius collurio*

Des oiseaux attardés en novembre 2020 : une femelle adulte a été photographiée le 16 à Vauvert, Gard (J.-P. Trouillas), et un mâle adulte a séjourné du 18 au 29 à Marvejols, Lozère, à près de 800 m d'altitude (C. Goux et R. Destre, Faune LR).

16. Faucon sacre *Falco cherrug*, 1^{re} année, Mongolie, août 2007 (Matthieu Vaslin). 1st-cy Saker Falcon.

**Pie-grièche à poitrine rose** *Lanius minor*

Un deuxième cas de trio nicheur a été observé chez cette espèce en 2016 dans l'Hérault (TON 2018). En 2018, il ne restait que 4 couples nicheurs en France, trois dans l'Hérault et un, ayant mené à bien sa nichée, en Crau, Bouches-du-Rhône. L'année 2019 sera celle de la dernière nidification de l'espèce dans notre pays : un couple ayant échoué sa reproduction dans l'Hérault (*Ornithos* 28-2 : 104-105) ; plus rien depuis... La Pie-grièche à poitrine rose ne niche plus en France.

Pie-grièche grise *Lanius excubitor*

Le déclin de l'espèce se poursuit : il n'y a plus de nicheurs depuis 2015 en Picardie, en dépit de recherches en Thiérache, Aisne (P. Malignat).

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator*

En Lozère, un mâle et au moins deux jeunes ont été observés le 10 juillet 2020 à Hures-la-Parade (R. Turban, Faune LR) ; il s'agit de la première nidification de l'espèce dans ce département depuis 1994 (BARTHEZ & LEGENDRE 2021)

Pie-grièche masquée *Lanius nubicus*

Troisième mention française de l'espèce : un individu (apparemment femelle) photographié en mai 2022 en Camargue, Bouches-du-Rhône (*Ornithos* 29-4 : 247). Les précédentes données provenaient toutes du Sud-Est : un individu le 18 avril 1961 près de Nice, Alpes-Maritimes, et un autre (mâle probable) le 10 avril 2008 en Camargue.

Passeriformes – Oriolidae**Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus*

Effectif remarquable de 450 individus en migrations active le 23 avril 2020 à Prunete, Haute-Corse, pour un total printanier de 626 individus (collectif Prunete, Trektellen).

Passeriformes – Corvidae**Geai des chênes** *Garrulus glandarius*

Afflux important à l'automne 2019 dans le nord et l'est de la France, avec par exemple un total de 13 398 individus observés au Crêt des Roches, Doubs.

Crave à bec rouge *Pyrhocorax pyrrhocorax*

Le premier cas de nidification sur un bâtiment en France a été noté le 30 mai 1993 sur le causse du Larzac, commune du Cros, Hérault (CUGNASSE 2021).

Quelques données hors des secteurs traditionnels de l'espèce : en Bretagne, un individu a été photographié le 1^{er} septembre 2019 au cap Fréhel, Côtes-d'Armor (B. Bousquet *in* eBird) ; en Bourgogne-Franche-Comté, un oiseau vu le 20 janvier 2019 à Vergisson, Saône-et-Loire, constitue une première régionale (Cœur *et al.* 2019) ; dans le Gard, un individu a été observé les 21 et 25 janvier 2017 en plaine, à Saint-Gilles (J. Menoux, Faune LR) et Vauvert (C. Richard, Faune LR).

Un recensement coordonné des dortoirs hivernaux de l'espèce en 2018 et 2019 a permis d'évaluer la population du Massif central entre 1 066 et 1 264 individus (DEMAY *et al.* 2021).

Choucas des tours *Coloeus monedula*

Depuis le milieu des années 2010, l'espèce est en train de s'implanter en Corse (J.-C. Thibault *in litt.*) ; la première preuve de reproduction a été notée le 14 mai 2016 à Sorbo-Ocagnano, Haute-Corse (A. Leoncini, Faune France) ; depuis, l'installation de l'espèce a aussi été constatée à Bonifacio, Ajaccio, Porto-Vecchio et Coggia pour la Corse-du-Sud, ainsi qu'à Biguglia, Lucciana, Vescovato, Venzolasca, Borgo et Aléria pour la Haute-Corse (Faune France).



17. Hirondelle de rivage
Riparia riparia, adulte,
Côtes-d'Armor, mai 2011
(Fabrice et Laurent Desage).
Adult Sand Martin.

Corbeau freux *Corvus frugilegus*

L'espèce continue à coloniser les régions méditerranéennes (OLIOSO 2014) : première reproduction dans les Alpes-de-Haute-Provence, avec des nids en construction le 13 mars 2016 à Manosque (M. Davin, Faune PACA) et dans l'Aude, où deux colonies sont trouvées en 2018 à Narbonne et à Lézignan-Corbières, puis un couple en 2021 à Sigean ; prélude possible à une future installation, 5 individus sont notés le 13 avril 2021 à Sanary-sur-Mer, Var (J.-B. Cadino, Faune PACA).

Dans l'Aude, un groupe de 18 individus est observé le 12 août 2019 à plus de 900 m d'altitude à Aunat (P. Jourde, Faune LR). Poursuivant sa progression vers le sud, l'espèce niche désormais à Figueres, Catalogne espagnole.

Corneille mantelée *Corvus cornix*

Les observations restent très rares à l'ouest du Rhône : dans l'Aude, un individu en migration active le 16 avril 2017 à Gruissan (D. Clément) et un individu le 4 mars 2018 à Leucate (S. Roques Faune LR).

Passeriformes – Paridae

Mésange noire *Periparus ater*

Deux individus présentant les caractères de la sous-espèce irlandaise *hibernicus* ont été observés le 9 octobre 2020 à Ouessant, Finistère (S. Gautier ; *Ornithos* 28-1 : 58), tandis qu'un oiseau au phénotype *britannicus* était vu le 11 octobre 2020 sur l'île de Sein, Finistère ; aucune de ces sous-espèces n'est encore inscrite sur la LOF. Un individu tardif photographié en Camargue le 7 mai 2019 (M. Normant, Faune PACA). Reproduction sur les hauts de Nice, Alpes-Maritimes en 2020.

Mésange boréale *Poecile montanus*

L'espèce est en diminution en Picardie, où un repli de son aire de présence vers le nord et l'est a été remarqué ; elle a disparu dans la moitié sud de l'Oise (P. Malignat).

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus*

Passage remarquable de plus de 13 000 individus au défilé de Fort-l'Écluse, Haute-Savoie, à l'automne 2017 (S. Brook, X. Birot-Colomb, LPO Haute-Savoie).

Mésange azurée *Cyanistes cyanus*

Un individu bagué, d'origine inconnue (mais sans doute captive), a été observé les 20 et 21 avril 2020 à Marseille, Bouches-du-Rhône, et photographié (S. Brook, Faune PACA).

Passeriformes – Remizidae

Rémiz penduline *Remiz pendulinus*

Une analyse des routes migratoires de l'espèce a été réalisée à partir de 57 393 données de baguage collectées en Europe depuis 60 ans. Jusqu'en 1975, la Rémiz penduline, qui nichait alors uniquement en Europe centrale, hivernait en région méditerranéenne. Mais suite à l'expansion de son aire de nidification vers le nord-ouest dans les dernières décennies du xx^e siècle, ses zones d'hivernage se sont aussi déplacées vers l'ouest et le sud-ouest, et les oiseaux de Belgique, des Pays-Bas et du Danemark utilisent désormais une nouvelle voie migratoire, qui suit la côte atlantique française, pour aller hiverner dans le sud-ouest de la France et en Espagne. Les oiseaux provenant de Suisse, d'Italie et d'Europe orientale continue à suivre la voie migratoire historique en suivant la côte méditerranéenne, tandis que ceux d'Europe centrale (Allemagne, Pologne) empruntent l'une ou l'autre de ces voies (P.-Y. Henry, *CRBPO Info* février 2019).

Passeriformes – Alaudidae

Cochevis huppé *Galerida cristata*

Encore observé sur plusieurs communes de la côte picarde, il est au bord de l'extinction dans le reste de la région, avec seulement un ou deux sites occupés par an (P. Malignat).

Quelques observations en altitude dans les Pyrénées-Orientales : un mâle chanteur le 19 juillet 2018 à 1 226 m à Nahuja (B. Thomas, A. Iglésis, Faune LR), un individu le 5 juin 2018 à 1 925 m au col de Puymorens (T. Guillosson, Faune LR), 4 le 17 août 2019 à 1 556 m à Font-Romeu (L. Bourgeois, Faune LR), un le 3 août 2021 à 1 998 m à Angoustrine-Villeneuve-des-Escalades (J.-Y. Bartolich, Faune LR) ; un le 24 septembre 2021 à 1 910 m à Porté-Puymorens (S. Dulau, Faune LR). Un groupe d'une cinquantaine d'individus a été observé le 4 mars 2018 à Mérindol, Vaucluse (N. Vissyras, Faune PACA).

Alouette haussecol *Eremophila alpestris*

Première mention corse avec un individu le 18 avril 2022 à Lucciana, Haute-Corse (*Ornithos* 29-4 : 246).

Alouette monticole *Melanocorypha bimaculata*

L'observation d'un individu le 11 avril 2015 à Hyères, Var, constitue la première mention française de l'espèce (AUDEVARD 2018).

Passeriformes – Hirundinidae

Hirondelle de rivage *Riparia riparia*

Données précoces, pouvant parfois concerner un hivernage local : un individu le 7 janvier 2017 à Plovan, Finistère (S. Cornec, Faune Bretagne), un le 19 janvier 2019 à Vic-la-Gardiolle, Hérault, et un le 23 janvier 2019 à Mireval, Hérault (P. Gitenet, Faune LR).

Hirondelle rustique *Hirundo rustica*

Près de 168 000 individus ont été comptés au printemps 2018 à Prunete, Haute-Corse (G. Caucal *et al.*, *coches.fr*), mais aussi 102 000 oiseaux le 22 avril 2021 au même endroit (Trekellen) ; il s'agit sûrement d'un record journalier européen sur un site de migration, sans doute dû à des conditions météorologiques particulières et non, on peut le regretter, à une quelconque augmentation des effectifs, l'espèce étant en déclin de 23% à l'échelle européenne de 2009 à 2019.

Une mortalité importante a été relevée à l'automne 2020 dans le Massif central en lien avec l'arrivée précoce et brutale d'un épisode froid dû à la tempête *Alex* (BIRÉE 2021).

Hirondelle de rochers *Ptyonoprogne rupestris*

Rassemblements postnuptiaux notables: environ 500 individus le 17 août 2020 à Saint-Bonnet-de-Montauroux, Lozère (C. Mauvais, Faune LR); 625 individus du 2 au 11 novembre 2020 sur la façade d'un immeuble à Toulon, Var (O. Reisinger, Faune France).

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum*

Deux individus précoces sont observés le 29 janvier 2017 à la Seyne-sur-Mer, Var (A. & J.-F. Bach, Faune PACA). Une forte mortalité d'oiseaux piégés par l'arrivée précoce et brutale d'un épisode froid a été notée à l'automne 2020 dans le Massif central (BIRÉE 2021).

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*

En 2020, à partir des données récoltées sur Faune Languedoc-Roussillon et Faune PACA, la population du sud de la France a été estimée à 100 couples (et « probablement beaucoup plus »), l'espèce étant surtout concentrée dans le Var (S. Detalle).

Reproduction très tardive à La Garde-Freinet, Var, en 2015 avec l'envol du premier jeune de la nichée entre le 13 et le 15 octobre et le départ de la famille entre le 20 et 23 octobre (D. Huin), mais aussi en 2017 à Collioure, Pyrénées-Orientales, où un nourrissage est encore noté le 30 octobre (S. Bouget, Faune LR). Données tardives: 2 individus photographiés le 26 décembre 2017 au cap Fréhel, Côtes-d'Armor (A. Lavorel, Faune Bretagne); 3 individus le 14 décembre 2019 à Leucate, Aude (S. Roques, Faune LR).

Passeriformes – Phylloscopidae**Pouillot siffleur** *Phylloscopus sibilatrix*

Reproduction prouvée dans les Alpes-Maritimes, où une famille est observée le 30 juin 2018 à Belvédère, à 1 400 m d'altitude (G. Jouvencz, Faune PACA).

L'espèce a fortement diminué dans les massifs forestiers de l'Oise et de l'Aisne et a disparu de nombreuses parcelles des forêts d'Halatte, de Chantilly, d'Ermenonville, de Compiègne, d'Hez et de Retz (P. Malignat).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*

Un chanteur très précoce le 22 février 2019 à Laroque-de-Fa, Aude (M. Vaslin, Faune LR).

À la différence du Pouillot siffleur *P. sibilatrix*, ce pouillot semble en augmentation dans certaines forêts du sud de l'Oise, après une contraction de son aire au tout début des années 2000 (P. Malignat).

Pouillot oriental *Phylloscopus orientalis*

Un individu photographié et enregistré le 21 mai 2017 à Frontignan, Hérault, fournit la première mention documentée de l'espèce en France (WROZA 2020).

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*

La présence d'un individu du 15 décembre 2014 au 13 avril 2015 à Neuilly-Plaisance, Seine-Saint-Denis, est sans doute le premier cas d'hivernage de l'espèce à l'intérieur des terres en France (LAPORTE 2016). Au terme d'un afflux automnal sans précédent en 2016 – plus d'un millier d'individus signalés en France, dont 890 en Bretagne –, plusieurs cas d'hivernage seront signalés dans cette région (p. ex. 20 individus sur 10 sites dans la dernière décennie de décembre; GUÉRIN *et al.* 2018).

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus*

Séjour hivernal d'un individu du 3 au 20 décembre 2021 à Paris-13^e (GIRAUD 2022).

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus*

Une femelle s'est reproduite à deux reprises avec un Pouillot véloce *P. collybita* au printemps 2019 dans le port de Dunkerque, Nord; c'est le premier cas de nidification d'un couple mixte hors de l'aire de répartition de l'espèce (PIETTE 2022).

Pouillot de Temminck *Phylloscopus coronatus*

Un oiseau de 1^{re} année observé et photographié le 22 octobre 2016 à Ouessant, Finistère, constitue la première donnée française de cette espèce asiatique (GUILPAIN & VINCENT 2018).

Passeriformes – Acrocephalidae**Rousserolle des buissons** *Acrocephalus dumetorum*

Un chanteur en juin 2022 dans le bassin du Drugeon, Doubs (D. Michelat; *Ornithos* 29-4: 257). Rappelons que l'espèce progresse nettement vers l'ouest depuis quelques décennies...

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*

Donnée tardive: un individu capturé et bagué le 18 novembre 2020 à Mireval, Hérault (B. Vollet).

Passeriformes – Locustellidae**Locustelle de Pallas** *Locustella certhiola*

Le CHN a récemment révisé les observations françaises de cette espèce (JIGUET *et al.* 2019) et deux ont été retenues: un individu capturé le 4 octobre 2008 à Villeton, Lot-et-Garonne (L. Brucy *et al.*) et un autre le 24 septembre 2018 à Tréogat, Finistère (L. Bonnot; *Ornithos* 25-6: 384).

Locustelle lancéolée *Locustella lanceolata*

Comme celles de la Locustelle de Pallas *L. certhiola*, les données françaises de cette espèce ont été révisées par le CHN (JIGUET *et al.* 2019). Quatre observations ont été retenues: un individu trouvé mort le 11 septembre 1986 à Ouessant, Finistère (Y. Guermeur), un individu trouvé mort et un autre observé vivant le 15 septembre 2007 à Sein, Finistère (A. Larousse, A. Le Névé *et al.*), et un individu observé et photographié le 9 octobre 2017 à Sein, Finistère (S. Guérin *et al.*).

18. Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*, adulte, Creuse, avril 2013 (Fabrice et Laurent Desage). *Adult Wood Warbler*.





19. Fauvette de Rüppell
Curruca ruppeli, mâle,
Camargue, avril 2019
(Thierry Laurent).
Male Rüppell's Warbler.

Passeriformes – Cisticolidae

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis*

Records d'altitude dans le Sud : un chanteur à 1 400 m le 24 juin 2017 à Agnières-en-Dévoluy, Hautes-Alpes (M. et R. Taib-Fonters, Faune PACA) ; 2 individus, dont un en vol territorial, à 1 637 m le 19 août 2020 à Bolquère, Pyrénées-Orientales (C. Berthelot, Faune LR).

Passeriformes – Leiothricidae

Léiothrix jaune *Leiothrix lutea*

La mortalité inexplicée (virus ? intoxication ?) de dizaines d'individus a été signalée en octobre 2020 près de Pau, Pyrénées-Atlantiques, et à Lourdes, Hautes-Pyrénées (G. Dupont et P. Navarre *vide* J.-L. Grangé). Le 11 octobre 2022, une troupe de plus de 70 individus se perchait sur des conifères a été observée au col de Soulor, Hautes-Pyrénées, à 1 500 m d'altitude (J.-L. Grangé *in litt.*).

Passeriformes – Sylviidae

Fauvette babillarde *Curruca curruca*

En Picardie, l'espèce se replie vers le nord et l'est, et a quasiment disparu de la moitié sud du département de l'Oise (P. Malignat).

Un oiseau capturé et bagué le 25 octobre 2017 sur l'île d'Ouessant, Finistère, a pu être attribué à la sous-espèce sibérienne *blythii*, ce qui constitue la première mention authentifiée de ce taxon en France (BOUZENDORF *et al.* 2019). Un individu de type « oriental » a hiverné du 28 novembre au 14 mars 2022 à Montreuil, Seine-Saint-Denis (PUAUD 2022).

Fauvette orphée *Curruca hortensis*

Record d'altitude : présence de l'espèce jusqu'à 1 951 m à Valcebollière, Pyrénées-Orientales, avec un chanteur les 16 juillet 2017, 5 juin 2021 et 22 mai 2022 (Q. Giraudon, E. Roy, F. Olivier, Faune France).

Fauvette de Rüppell *Curruca ruppeli*

Un mâle de 2^e année, présent du 31 mars au 9 avril 2019 aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône (*Ornithos* 26-2 : 99), fournit la troisième mention française de l'espèce, après celles du 20 mars 1970 (mâle) à l'embouchure du Var, Alpes-Maritimes, et du 20 mai 1996 (mâle chanteur) en Camargue, Bouches-du-Rhône (DUBOIS *et al.* 2008).

Fauvette mélanocéphale *Curruca melanocephala*

Records d'altitude pour la nidification dans les Pyrénées-Orientales : un couple nicheur le 23 juin 2020 à 1 320 m à Jujols (F. Olivier, Q. Giraudon, Faune LR) et 2 individus le 1^{er} mai 2017 à 1 577 m à Font-Romeu (B. Tomas, A. Iglesias, Faune LR).

Fauvette à lunettes *Curruca conspicillata*

Au printemps 2020, 6 mâles chanteurs ont été découverts dans les monts du Cantal et un couple nourrissant des jeunes a été noté le 20 juillet sur le versant méridional du Puy de Peyre Arse, Cantal (VÉRITÉ 2021). Ces données viennent compléter celles de DUBOIS & CROUZIER (1999) et semblent donner un peu plus de poids à la possibilité d'une petite population montagnarde cryptique dans le sud du Massif central. Dans les Pyrénées-Orientales, la population d'altitude du massif du Madres (1 000-1 900 m) est en net déclin : en effet, sur les 9 territoires recensés en 2009 et 2014, un seul subsistait en 2021 ; le territoire le plus haut se trouvait à 1 949 m (GO Roussillon).

Un individu était présent le 15 janvier 2018 en Camargue, Bouches-du-Rhône, où l'hivernage n'est peut-être plus régulier (L. Ton, Faune PACA).

Fauvette pitchou *Curruca undata*

Dans les Alpes-Maritimes, une petite population existe au-dessus de 1 200 m d'altitude : jusqu'à 3 mâles (dont un chanteur) notés en avril 2017 à Valdeblorre entre 1 218 et 1 284 m (D. Canestrier, Faune France), et même 1 individu à 1 731 m le 1^{er} octobre 2017 (A. Ellie, Faune France).



20. Fauvette pitchou
Curruca undata, adulte,
Bouches-du-Rhône, mars
2021 (Thomas Perrier).
Male Dartford Warbler

Passeriformes – Sittidae**Sittelle corse** *Sitta whiteheadi*

Le déclin de l'aire de répartition et des effectifs de cette sittelle endémique de Corse se poursuit, en lien avec les défrichements, l'exploitation forestière et les incendies. Depuis le début du XXI^e siècle, l'espèce a ainsi fortement régressé en Corse-du-Sud, dans le bois de Verdane et la forêt de Pineta, et a même disparu des forêts de San Pietro d'Accia, Haute-Corse, et de Cagna, Corse-du-Sud, des localités situées en périphérie de l'aire de répartition principale de l'espèce. Les causes évoquées pour expliquer la régression de cette espèce unique sont l'isolement géographique des petites populations en question, mais aussi la disparition grandissante du Pin laricio *Pinus nigra laricio* au profit du Hêtre *Fagus sylvatica* et l'absence de prise en compte de l'espèce dans la gestion forestière (SEGUIN *et al.* 2017).

Passeriformes – Tichodromidae**Tichodrome échelette** *Tichodroma muraria*

L'hivernage de l'espèce en France a été analysé, mettant en évidence : d'une part que les oiseaux arrivent sur leurs lieux d'hivernage entre le 20 octobre et le 30 novembre et les quittent entre le 20 mars et le 10 avril ; d'autre part qu'ils hivernent majoritairement en dessous de 500 m d'altitude (moyenne : 370 m ; n = 10 271), mais aussi jusqu'à 1 500 m d'altitude dans les villages alpins, rarement plus haut, le record étant détenu par un oiseau vu le 27 septembre 2014 à 2 821 m d'altitude dans l'Isère (PRAMPART 2021).

Passeriformes – Sturnidae**Étourneau roselin** *Pastor roseus*

Un afflux très important a eu lieu en Europe occidentale au printemps 2018. En France, c'est surtout le quart sud-est du pays qui a été concerné. Entre le 24 mai et le 8 août, au moins 2 300 oiseaux ont été observés, ce qui doit être considéré comme le nombre minimal d'individus présents en France durant cette période (TOUZÉ 2019). En 2020, un afflux de moindre importance a également eu lieu ; toutefois, si le nombre d'oiseaux était plus faible qu'en 2018, cet afflux a été marqué par le premier cas de reproduction de l'espèce en France, sur le plateau de Valensole, Alpes-de-Haute-Provence, où une douzaine de couples nicheurs ont produit 20-30 jeunes (DUQUET *et al.* 2022). Un nouvel afflux important s'est produit en mai-juin 2021 : les premiers oiseaux ont été vus le 26 mai dans le Var et l'Hérault et un maximum de 320 individus a été noté le 30 mai à Sanary-sur-Mer, Var.

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor*

Après les reproductions extra-méditerranéennes en 2013 au Teich, Gironde, et en 2015 à Hures-la-Parade, Lozère, un mâle a niché avec une femelle d'Étourneau sansonnet *S. vulgaris* en 2021 à Saint-Denis-d'Oléron, Charente-Maritime, produisant 3 jeunes hybrides (G. Enselme, A Duez et O. Lалуque).

Passeriformes – Turdidae**Grive litorne** *Turdus pilaris*

En 2016, un adulte et un immature sont observés le 25 juin à Fère-en-Tardenois, Aisne, à la limite occidentale de l'aire de nidification actuelle de l'espèce (P. Malignat).

Grive mauvis *Turdus iliacus*

Les observations et reprises de bague de la sous-espèce islandaise *coburni* ont été analysées et confirment sa présence régulière en France, entre mi-octobre et début avril, dans les départements situés à l'ouest d'une ligne reliant Saint-Malo, Ille-et-Vilaine, et Toulouse, Haute-Garonne ; il s'agit en majorité d'oiseaux de 1^{re} année, les adultes hivernant majoritairement dans les îles Britanniques (DUQUET 2018).

21. Étourneau unicolore
Sturnus unicolor, mâle,
Estrémadure, Espagne,
mai 2013 (Gilles Balança).
Male Spotless Starling.

**Passeriformes – Muscicapidae****Gobemouche tyrrhénien** *Muscicapa tyrrhenica*

Considéré autrefois comme une sous-espèce du Gobemouche gris *M. striata*, le Gobemouche tyrrhénien a été récemment élevé au rang d'espèce et compte deux sous-espèces : *tyrrhenica* endémique de Corse, de Sardaigne et du littoral toscan ; *balearica* endémique de l'archipel des Baléares (voir OLUSO *et al.* 2019 et WROZA 2019).

Un petit afflux a été noté au printemps 2021 (28 avril-16 mai) sur le littoral méditerranéen, dont au moins 4 individus (2 en Camargue, 1 dans l'Hérault et 1 dans l'Aude) ayant pu être attribués à la sous-espèce *balearica*, appelée Gobemouche des Baléares (voir JIGUET 2020) ; au printemps 2022, de nombreux individus présentant les caractères de cette sous-espèce ont de nouveau été signalés sur le pourtour méditerranéen (*Ornithos* 29-4 : 249).

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca*

Suite à des prospections en 2017, on observe que l'espèce se maintient dans les grandes forêts domaniales de l'Oise et de l'Aisne (P. Malignat).

Observations très tardives : un individu le 2 décembre 2018 au parc du confluent Garonne-Ariège, Haute-Garonne (C. Pasquier *et al.*, eBird) ; un individu le 22 décembre 2014 à Portiragnes, Hérault (Y. Tremauville, Faune LR).

Rougequeue noir *Phoenicurus ochruros*

Un mâle présentant les caractères de la sous-espèce orientale *phoenicuroides*, a séjourné du 28 janvier au 3 février 2017 à Antibes, Alpes-Maritimes (Faune PACA ; *Ornithos* 24-2 : 128).

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus*

Donnée hivernale : un mâle du 13 au 26 janvier 2020 à Nîmes, Gard (C. et M. Garcia, Faune LR).

Monticole bleu *Monticola solitarius*

Première preuve de reproduction de l'espèce dans les Hautes-Pyrénées, où un couple a niché avec succès en 2021 et 2022 dans le val d'Azun (HABAS 2022).

Traquet (motteux) de Seeböhm *Oenanthe (oenanthe) seebohmi*

Un mâle de 2^e année observé et photographié le 7 mai 2019 à Saily-lez-Lannoy, Nord, constitue la première mention française de ce taxon nord-africain et la cinquième pour l'Europe – un mâle en avril 2005 à Gibraltar, en mai 2014 en Sardaigne, en mars 2016 à Malte et en mai 2017 aux Pays-Bas (DÉROZIER 2020).

Passeriformes – Cinclidae**Cinle plongeur** *Cinclus cinclus*

Un individu à ventre noir a hiverné du 23 novembre 2021 au 3 mars 2022 au Havre, Seine-Maritime, une rareté en Normandie; il s'agit potentiellement d'un oiseau originaire de Scandinavie (*Ornithos* 29-1 : 59).

Passeriformes – Passeridae**Moineau cisalpin** *Passer italiae*

Rares observations hors de l'aire de répartition connue: un mâle les 20 et 22 avril 2017 aux Saintes-Maries-de-la-Mer, Bouches-du-Rhône (H. Kohler, Faune PACA); un mâle apparié à une femelle (non identifiée spécifiquement) nourrissant des jeunes au nid le 16 juin 2018 à Valensole, Alpes-de-Haute-Provence (Q. Guibert, S. Wroza, Faune PACA).

Moineau friquet *Passer montanus*

Autrefois commun en Picardie, ce moineau risque de disparaître de cette région: il a déjà pratiquement disparu en tant que nicheur à l'ouest de la rivière Oise, mais reste le mieux représenté en Thiérache et est encore présent en moyenne vallée de l'Oise; il subsiste encore sur cinq sites du Valois et de la plaine de France (P. Malignat). Il a quasiment disparu de Bretagne également (Faune Bretagne).

22. Moineau friquet *Passer montanus*, adulte, Tarn, février 2012 (Christian Aussaguel). *Adult Tree Sparrow*.

**Niverolle alpine** *Montifringilla nivalis*

Un individu observé le 31 mai et le 20 juin 2017 à 2254 m d'altitude à Eyne, Pyrénées-Orientales (Faune LR) pourrait être un nicheur, dans une région où la reproduction n'est pas vraiment connue. À l'automne 2017, plusieurs groupes en migration ont été vus dans l'Hérault et l'Aude, dont un vol de 70 individus le 10 novembre 2017 à Gruissan, Aude, mettant en évidence de véritables mouvements postnuptiaux des Alpes vers les Pyrénées (OLIOSO *et al.* 2003, ALBOUY & RIOLS 2018). Des groupes monospécifiques sont de nouveau notés en 2021 dans l'Aude – 21 individus le 6 novembre à Gruissan (F. Escot, Faune France) – et en 2022 dans l'Hérault – 37 et 41 individus le 24 février 2022 à Valflaunès (S. Tillo, R. Dallard, Faune France) et 20 individus le 26 février à Rosis (D. Burges, Faune France).

Passeriformes – Estrildidae**Capucin bec-de-plomb** *Euodice malabarica*

L'espèce s'installe loin de Nice, Alpes-Maritimes, sa région d'introduction (Faune PACA). Dans le Var: une petite population existe à Fréjus (C. Bury), un individu a été vu en février 2018 à Six-Fours-les-Plages (S. Fausten), jusqu'à 5 en mars 2020 à La Seyne-sur-Mer (M. Gavini, A. et F.M. Zwank) et 6 en décembre 2020 à Carqueiranne (C. Elnouchi, Faune PACA); en 2021, la construction de nids a été observée dans la plupart de ces communes. Dans les Bouches-du-Rhône, les nouvelles localités se multiplient: Aix-en-Provence (J. Gattacceca), Arles (M. Pélissié) et Marseille (G. Lemaire) en 2020, Rognac (E. Pujolas), Aubagne (M. Pélissié) et Aureille (*vide* T. Girard) en 2021 et Châteauneuf-les-Martigues (M. et J. Le Bournot) en 2022. Des observations faites plus à l'ouest concernent plus vraisemblablement des échappés de captivité: dans l'Hérault, à Mireval (P. Lenoir), Montpellier (C. Sabran) et Le Crès (G. Duvert); dans le Gard à Ners (C. Giraud) et à Vauvert (J.-P. Trouillas).

Passeriformes – Prunellidae**Accenteur alpin** *Prunella collaris*

Trois individus semblant en migration active ont été vus le 14 octobre 2018 au cap Ferret, Gironde (S. Wroza et P. Legay). Deux individus étaient présents en janvier 2019 dans les rues du Mont-Saint-Michel, Manche (*Ornithos* 26-2 : 100), bien loin de leurs montagnes, et un autre, photographié le 16 avril 2022 sur l'île d'Yeu, est le premier pour cette île vendéenne (*Ornithos* 29-4 : 251). Un oiseau bagué le 28 novembre 2015 à Sant Jeroni, Catalogne espagnole, a été observé le 1^{er} novembre 2017, probablement en migration, à Saint-Rome-de-Cernon, Aveyron (R. Straughan, Faune France).

Passeriformes – Motacillidae**Bergeronnette orientale** *Motacilla tschutschensis*

La première mention de ce taxon, autrefois traité comme une sous-espèce de la Bergeronnette printanière *M. flava*, a été obtenue le 29 octobre 2016 sur l'île d'Ouessant, Finistère (GUILLE 2018). Depuis cette date, le nombre d'observations en France augmente.

Pipit de Richard *Anthus richardi*

En France, la population hivernante est estimée entre 50 et 100 individus (TOUZÉ & MÉRIOT 2017), un effectif qui s'explique en partie par une meilleure recherche hivernale de l'espèce, mais aussi par une réelle augmentation de ses effectifs. Des baguages effectués en hiver révèlent en outre une fidélité des oiseaux à ces sites, avec des contrôles les années suivantes, comme par exemple à Fréjus, Var, et à Labruguière, Tarn (Faune France), ou encore à Lespignan, Hérault (G. Picotin; *Ornithos* 29-1 : 58). Cela correspond à la mise en place récente d'une voie de migration longitudinale de 6000 km entre les zones les plus occidentales de l'aire de nidification asiatique de l'espèce et ses nouveaux quartiers d'hivernage dans le sud et l'ouest de la France, ainsi qu'en Espagne, au Portugal et en Italie (DUFOR *et al.* 2021).

Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni*

Premier cas d'hivernage signalé en France: un individu est observé du 16 décembre 2017 au 5 mars 2018 à Cinq-Mars-la-Pile, Indre-et-Loire (ISSA & RÉVEILLAUD 2018). La pratique de l'écoute sonore en France (comme en Europe), et particulièrement l'écoute nocturne en migration, a permis de détecter un nombre croissant de Pipits à dos olive à l'automne.

Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus*

Donnée hivernale: un individu a été observé, photographié et enregistré le 24 janvier 2017 aux Hemmes-de-Marck, Pas-de-Calais (Q. Dupriez, A. Mauss).

Un migrateur tardif a été photographié le 3 juin 2017 à Nice, Alpes-Maritimes (F. Dauphin, Faune PACA).

Pipit farlousane *Anthus rubescens*

Un individu présentant les caractères de la sous-espèce asiatique *japonicus* a séjourné du 22 décembre 2018 au 8 janvier 2019 en Camargue près de Salin-de-Giraud, Bouches-du-Rhône, fournissant la première mention française de ce taxon (CROCHET *et al.* 2021).

Passeriformes – Fringillidae**Pinson du Nord** *Fringilla montifringilla*

Un mâle chanteur (!) a été observé le 29 mai 2020 à Leucate, Aude (Med Migration, Faune France).

Sizerin cabaret *Acanthis cabaret*

À partir de la mi-octobre 2017, un nombre de sizerins beaucoup plus important que d'ordinaire a atteint la France. Le baguage a montré que la plupart provenaient du Royaume-Uni. Des oiseaux ont été observés jusqu'en Camargue (POISSON & PROVOST 2019).



23. Pipit à gorge rousse
Anthus cervinus, Var, avril
2021 (Aurélien Audevard).
Red-throated Pipit.

24. Venturon montagnard
Carduelis citrinella, mâle,
Var, décembre 2012
(Aurélien Audevard).
Male Citril Finch.

**Sizerin flammé** *Acanthis flammea*

À la mi-octobre 2017, quelques individus de cette espèce nordique voyageaient avec l'espèce précédente. Si les observations et les captures ont été faites surtout dans le nord de la France, une quarantaine d'individus ont été bagués en Lozère. Cette espèce n'était pas connue pour gagner des régions aussi méridionales en si grand nombre (POISSON & PROVOST 2019).

Sizerin blanchâtre *Acanthis hornemanni*

Un individu présentant les caractères de la sous-espèce type a été photographié le 25 octobre 2020 à Ouessant, Finistère (J. Renoult; *Ornithos* 28-1: 63), quatrième donnée pour l'île et douzième pour la France. L'espèce reste très rare dans notre pays, où la précédente donnée, qui provenait déjà d'Ouessant, datait du 29 novembre 2008.

Bec-croisé perroquet *Loxia pytyopsittacus*

Dans le cadre d'un afflux automnal de l'espèce en Allemagne et aux Pays-Bas, 2 oiseaux ont été observés le 14 octobre 2017 au Marquenterre, Somme, puis de 2 à 5 individus ont hiverné en forêt de Rambouillet, Yvelines, du 24 octobre 2017 au 18 mars 2018. Ce dernier jour, les 4 oiseaux encore présents – un couple pur et 2 mâles appariés à des femelles de Bec-croisés des sapins *L. curvirostra* (type C) – ont déserté la zone après 5 mois passés dans les pins laricios de la forêt de Rambouillet. Ils n'auront donc finalement pas niché sur place malgré de nombreux signes favorables... Le suivi aura nécessité la mise sous écoute de quelque 10 km² de pinèdes (WROZA *et al.* 2018).

Bec-croisé d'Écosse *Loxia scotica*

Un individu présentant les caractères morphologiques et acoustiques (type N20) de ce taxon endémique d'Écosse a été observé et enregistré au cours de l'hiver 2020-2021 en forêt de Rambouillet, Yvelines, dans le cadre d'un afflux sans précédent de becs-croisés britanniques (WROZA & ROCHEFORT 2022).

Venturon montagnard *Carduelis citrinella*

Un individu a été enregistré le 30 juin 2016 en plaine de Chanfroy, Arbonne-la-Forêt, Seine-et-Marne, fournissant la première mention francilienne de l'espèce (J. Rochefort).



25. Bruant à gorge blanche *Zonotrichia albicollis*, 1^{re} année, Ouessant, octobre 2021 (Julien Gonin). 1st-yr White-throated Sparrow.

Tarin des aulnes *Carduelis spinus*

Nouvelle reproduction (au moins 3 couples) en 2017 au mont Ventoux, Vaucluse (D. Boccabella, Faune PACA). Plusieurs données estivales dans les monts d'Arrée, Finistère, au printemps 2020, avec notamment des mâles chanteurs en mai-juin à Saint-Rivoal (M. Esnault, S. Normant, Faune France) et à Hanvec (H. Touzé, Faune France), et un jeune avec du duvet observé le 16 août près de Brasparts, signant une reproduction locale très probable (L. Gager, Faune Bretagne).

Passeriformes – Emberizidae

Bruant zizi *Emberiza cirulus*

Avec le réchauffement climatique, on aurait pu s'attendre à ce que l'espèce remplace le Bruant jaune *E. citrinella*, mais cela ne semble pas être le cas. En Picardie, par exemple, on observe au contraire une réduction de l'aire de répartition du Bruant zizi, qui est devenu très rare dans la Somme, et a presque disparu entre les vallées de l'Oise et de la Marne ; il reste surtout présent dans le sud-ouest de l'Oise - Vexin, Thelle – ainsi que dans le Clermontois, la vallée du Matz, Oise, et celle de la Marne, Aisne (P. Malignat).

Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala*

Dans les Alpes-de-Haute-Provence : rares observations en 2017 et 2018, plusieurs sites occupés en 2019, aucune observation en 2020 et à nouveau 3 individus du 6 juin au 10 juillet 2021, dont un couple n'ayant pas réussi sa nidification (Faune PACA ; *Ornithos* 28-4 : 267). En juillet 2021, un mâle solitaire chantait également en Savoie (*Ornithos* 28-4 : 267).

Passeriformes – Passerellidae

Bruant à gorge blanche *Zonotrichia albicollis*

Après la première mention française de cette espèce néarctique le 20 avril 2008 à Saint-Marcel, Morbihan (JACKSON 2011), deux données récentes ont été obtenues : un oiseau de 1^{re} année présent du 17 au 25 octobre 2021 à Ouessant, Finistère (F. Veyrunes ; *Ornithos* 28-5 : 323) et un mâle chanteur ayant stationné du 3 juin au 23 juillet 2022 aux Bouchoux, Jura, à 950 m d'altitude (C. Saliner, Faune France ; *Ornithos* 29-3 : 179 & 29-4 : 257).

Passeriformes – Parulidae

Paruline couronnée *Seiurus aurocapilla*

La découverte de cette paruline nord-américaine le 27 septembre 2019 sur l'île de Molène, Finistère, constitue une première pour la France, mais aussi le début d'une série inédite de trois premières françaises de parulines à l'automne 2019 (WROZA 2021).

Paruline noir et blanc *Mniotilta varia*

Une femelle de 1^{re} année présente du 16 au 18 octobre 2019 sur l'île de Sein, Finistère, arrivée avec un Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus*, fournit la première mention française de l'espèce (SABATIER 2021).

Paruline à gorge orangée *Setophaga fusca*

Un mâle de 1^{re} année trouvé le 2 octobre 2019 sur l'île d'Yeu, Vendée, est une surprise incroyable, tant par la localisation géographique que par la rareté de cette espèce nord-américaine en Europe ; il s'agit en effet de la sixième mention ouest-paléarctique, et bien sûr d'une première pour la France (ISAAC 2020).

ESPÈCES EXOTIQUES

Cacatoès soufré *Cacatua sulphurea*

L'espèce semble en voie de s'installer dans le Sud-Est. Dans les Alpes-Maritimes : à Saint-Jean-Cap-Ferrat, où un couple a été signalé pour la première fois en novembre 2009 et où 7 individus étaient comptés en 2012 (J. Deffarges, DUBOIS *et al.* 2014), il y en avait 10 le 13 décembre 2018 (M. Oriol, Faune France) ; 2 oiseaux ont été notés le 31 mars 2017 et le 20 février 2019 à Beaulieu-sur-Mer (P. Ferry, C. Bonnard, Faune PACA) et 6 individus le 20 novembre 2019 à Villefranche-sur-Mer (M. Audibert, G. Jouvenez). Et dans l'est du Var, 3 individus ont été observés le 23 janvier 2022 à Fréjus (P. Bailleul, Faune France).

Conure veuve *Myiopsitta monachus*

La petite colonie marseillaise découverte en 2013 est toujours active au printemps 2022 (plus de 20 individus et au moins 7 nids), avec un effectif maximal de 22 individus et 9 nids notés le 21 mars 2017 (M. et A. Gasperini, P. Höhener).

REMERCIEMENTS

Un grand merci aux personnes, organismes et associations qui nous ont communiqué de nouvelles données. Merci à tous les observateurs (cités dans le texte) ayant saisi leurs observations sur les portails «Faune». Merci également à Dominique Clément (Aude Nature), Aurélien Deschatre (LPO Champagne-Ardenne), Jean-Louis Grangé (GO Pyrénées-Atlantiques), Pascal Malignat (GO Picardie) Aymeric Mionnet (LPO), Florian Olivier (GO Roussillon), qui nous ont transmis des données inédites.

BIBLIOGRAPHIE

• ALBOUY S. & RIOLS C. (2018). Afflux de Niverolles alpines *Montifringilla nivalis* entre Alpes et Pyrénées en 2017. *Ornithos* 25-1 : 24-29. • ALZAGA A., HERRERO A. & PAGOAGA A. (2018). Première reproduction du Goéland marin *Larus marinus* dans les Pyrénées-Atlantiques. *Le Casseur d'os* 18 : 142-145. • AUDEVARD A. (2018). Observation d'une Alouette monticole *Melanocorypha bimaculata* à Hyères en 2015 : première mention française de l'espèce. *Ornithos* 25-5 : 312-317.

• **BARADEZ R. & SÉNÉCAL D.** (2019). L'Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus*: migration et hivernage. *Ornithos* 26-2: 57-66. • **BARTHEZ E. & LEGENDRE F.** (2021). *Inventaire des oiseaux de Lozère – 2020*. ALEPE, Balsièges. • **BELTREMIEUX E.** (1884). Faune vivante du département de la Charente-Inférieure. Oiseaux. *Annales de l'Académie de la Rochelle, Section des Sciences Naturelles* XXIV: 112-142. • **BENMERGUI M., CHAZAL R., LENGAGNE T., GAYET G., CROUZIER P. & CROUZIER M.** (2012). Premier cas de reproduction du Cygne chanteur *Cygnus cygnus* en France en 2012. *Ornithos* 19-6: 396-403. • **BIRÉE P.** (2021). Sous la plume des lecteurs. Un curieux amas d'hirondelles... *Ornithos* 28-6: 394-395. • **BORET P., PENARD O. & DUBOIS P.J.** (2020). Chronique de la nidification de l'Eider à duvet *Somateria mollissima* en France. *Ornithos* 27-1: 33-45. • **BOUZENDORF F., PIETTE J. & CHEVALIER M.** (2019). Première mention authentifiée de la Fauvette babilarde de Sibérie *Sylvia curruca blythi* en France. *Ornithos* 26-6: 318-322. • **BROUILLARD Y.** (2018). Découverte de la Chevêchette d'Europe *Glauclidium passerinum* en Haute-Marne. *Ornithos* 25-1: 50-52. • **BRUNET B.** (2022). Reproduction du Fuligule nyroca *Aythya nyroca* dans la Creuse en 2021. *Ornithos* 29-1: 62-65. • **CAF** (2020). Liste officielle des Oiseaux de France – version 2020 (Catégories A, B et C). *Ornithos* 27-3: 170-185. • **CANNESON P., DEROO S. & DEROO S.** (2020). Premier cas de reproduction de l'Élanion blanc *Elanus caeruleus* dans le Pas-de-Calais. *Ornithos* 27-1: 46-56. • **CAVITTE G. & BOUTROUILLE C.** (2021). Première nidification d'un couple pur de Busards pâles *Circus macrourus* en France. *Ornithos* 28-3: 145-154. • **CHANSAC T.** (2021). Première mention pour la France du Goéland de la Véga *Larus vegae vegae*. *Ornithos* 28-6: 386-391. • **CLÉMENT D.** (2020). La Spatule blanche *Platalea leucorodia* nicheuse dans l'Aude en 2019: première mention pour l'Occitanie. *Ornithos* 27-1: 66-67. • **CŒUR S., DURY B., MAHUET B. & MEZANI S.** (2019). Première mention du Crave à bec rouge *Pyrhcorax pyrrhcorax* en Saône-et-Loire. *Ornithos* 26-4: 206-207. • **CORBEAU A., PAJOT M., PAJOT A. & PEROTEAU S.** (2022). Identification d'un hybride probable Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* x Guifette noire *C. niger* en Charente-Maritime en 2019. *Ornithos* 29-2: 132-133. • **COZIC E.** (2019). La nidification du Faucon pèlerin *Falco peregrinus* en Bretagne: état des lieux. *Ornithos* 26-6: 273-291. • **CROCHET P.-A., ARNAUD A., BÉCHET A., DUBOIS P.J., PONS J.-M., VEYRUNES F., WROZA S., JIGUET F. & DUFOUR P.** (2019). Le Flamant nain *Phoeniconaias minor* admis en catégorie A de la Liste des oiseaux de France. *Ornithos* 26-6: 292-297. • **CROCHET P.-A., DUBOIS P.J., DUFOUR P., JIGUET F., PIETTE J., PONS J.-M., REEBER S., WROZA S. & VEYRUNES F.** (2022). La Sarcelle à ailes bleues *Spatula discors* en France: statut actuel et catégorisation des données. *Ornithos* 29-1: 20-28. • **CROCHET P.-A., GALEWSKI T. & VEYRUNES F.** (2021). Première mention pour la France de la sous-espèce asiatique du Pipit farlousane *Anthus rubescens japonicus*. *Ornithos* 28-2: 132-136. • **CROUZIER P.** (2017). Reproduction de la Talève sultane *Porphyrio porphyrio* en Dombes (Ain). *Ornithos* 24-2: 130-133. • **CROUZIER P.** (2020). Premier cas de nidification de l'Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* en Dombes et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. *Ornithos* 27-4: 283-285. • **CROUZIER P.** (2022). Afflux majeur de Talèves sultanes *Porphyrio porphyrio* en Dombes, Ain, en 2021. *Ornithos* 29-4: 258-261. • **CUGNASSE J.-M.** (2021). Nidification du Crave à bec rouge *Pyrhcorax pyrrhcorax* sur un bâtiment en France. *Ornithos* 28-2: 137-139. • **DEMAÏ J., FONDERFLICK J. ET AL.** (2021). Comptages des dortoirs de Crave à bec rouge dans le Massif central (2018 & 2019). *Ornithos* 28-2: 112-121. • **DENIAU A. & PROVOST P.** (2020). Un Fou brun *Sula leucogaster* aux Sept-Îles: première mention en France métropolitaine. *Ornithos* 27-4: 276-279. • **DÉROZIER R.** (2020). Première mention du Traquet de Seeborn *Oenanthe oenanthe seebohmi* pour la France. *Ornithos* 27-5: 341-343. • **DÉTROIT C.** (2017). Chevêchette d'Europe. In EPOB (coord.), Atlas des oiseaux nicheurs de Bourgogne. *Rev. Sci. Bourgogne-Nature* Hors-série 15: 464. • **DUBOIS P.J. & CROUZIER P.** (1999). Tentative de reproduction de la Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* dans les monts du Cantal. *Ornithos* 6-4: 196-198. • **DUBOIS P.J., CROCHET P.-A., DUFOUR P., JIGUET F., PIETTE J., PONS J.-M., REEBER S., VEYRUNES F. & WROZA S.** (2021). La Bernache à cou roux *Branta ruficollis* en France: statut actuel et catégorisation des données. *Ornithos* 28-6: 337-344. • **DUBOIS P.J., DUQUET M., FOSSÉ A., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P.** (2012). Notes d'ornithologie française. Première mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France. *Ornithos* 19-1: 2-41. • **DUBOIS P.J., DUQUET M., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P.** (2014). Notes d'ornithologie française. Deuxième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France. *Ornithos* 169-213. • **DUBOIS P.J., LE MARÉCHAL P., OLIOSO G. & YÉSOU P.** (2008). *Nouvel inventaire des oiseaux de France*. Delachaux et Niestlé, Paris. • **DUBOIS P.J., MONTFORT D., DOURIN J.-L. & TROFFIGUÉ A.** (2022). Deux hybrides Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* x Guifette noire *C. niger* en Brière en 2021. *Ornithos* 29-2: 126-131. • **DUBOIS P.J., OLIOSO G., YÉSOU P., LE MARÉCHAL P. & DUQUET M.** (2017). Notes d'ornithologie française. Troisième mise à jour du nouvel inventaire des oiseaux de France. *Ornithos* 24-2: 57-107. • **DUBOIS P.J., WROZA S., DOURIN J.-L., TROFFIGUÉ A. & MONTFORT D.** (2020). Nidification probable de la Marouette de Baillon *Porzana pusilla* en Brière en 2019. *Ornithos* 27-2: 137-145. • **DUCOS É.** (2021). Histoire du Harle bièvre *Mergus merganser* en France: expansion et statut récent. *Ornithos* 28-4: 217-258. • **DUFOUR P., DE FRANCESCHI C., DONIOL-VALCROZE P., JIGUET F., GUÉGUEN M., RENAUD J., LAVERGNE S. & CROCHET P.-A.** (2021). A new westward migration route in an Asian passerine bird. *Current Biology* 31: 1-7. • **DUFOUR P., DUBOIS P.J., JIGUET F., PONS J.-M., VEYRUNES F., WROZA S. & CROCHET P.-A.** (2020). Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2016-2019). 15^e rapport de la CAF. *Ornithos* 27-3: 154-169. • **DUFOUR P., DUBOIS P.J., PONS J.-M., VEYRUNES F., WROZA S., YÉSOU P. & CROCHET P.-A.** (2021). Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2020-2021). 16^e rapport de la CAF. *Ornithos* 28-3: 155-167. • **DUFOUR P., VEYRUNES F. & LA CAF** (2019). Inscription du Pélican frisé *Pelecanus crispus* en catégorie A de la Liste des oiseaux de

France. *Ornithos* 26-6: 298-307. • **DUQUET M.** (2018). La Grive mauve islandaise *Turdus iliacus coburni*: statut en France et identification. *Ornithos* 25-3: 142-161. • **DUQUET M., BOUVIN L., VISSYRIAS N. & MARTINEZ N.** (2022). Premier cas de nidification de l'Étourneau roselin *Pastor roseus* en France en 2020. *Ornithos* 29-5: 307-318. • **FAUVEL B. & BROUILLARD Y.** (2021). Premières nidifications réussies du Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* en Champagne humide en 2019 et 2020. Éléments de contexte depuis le début des années 2000. *Ciconia* 45(1): 1-8. • **FÉVRIER Y., REYT S. & ROQUES S.** (2022). Le Puffin à bec grêle *Ardenna tenuirostris* en France en 2015 et 2020: premières mentions françaises. *Ornithos* 29-5: XXX-XXX. • **FOMBONNAT J.** (2004). Aigle botté. In THIOLLAY J.-M. & BRETAGNOLLE V. (coord.), *Rapaces nicheurs de France. Distribution, effectifs et conservation*. Paris, Delachaux et Niestlé: 100-103. • **FORTIN M.** (2018). Première mention de l'Albatros à bec jaune *Thalassarche chlororhynchus chlororhynchus* dans les eaux de France métropolitaine. *Ornithos* 25-3: 179-181. • **GAUDARD C., QUAINTEGNE G., WARD A., DRONNEAU CH., DALLOYAU S. & DUPUY J.** (2018). *Synthèse des dénombrements d'Anatidés, de foulques et de limicolles hivernant en France à la mi-janvier 2017*. Wetlands International, LPO, DEB, Rochefort. • **GENDRE N., ERAUD C., BRETAGNOLLE V., DALLOYAU S. & LES COORDINATEURS RÉGIONAUX** (2018). L'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* en France en 2012 et 2016: effectifs et répartition. *Ornithos* 25-5: 390-302. • **GENOVART M., JUSTE J., CONTRERAS-DIAZ & ORO D.** (2012). Genetic and Phenotypic Differentiation between the Critically Endangered Balearic Shearwater and Neighboring Colonies of Its Sibling Species? *J. of Heredity* 103: 330-341. • **GIRAUD I.** (2022). Séjour hivernal d'un Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* à Paris: une première en France? *Le Passer* 55: 27-28. • **GRANDPIERRE M.** (2021). Un couple de Goéland d'Audouin *Ichthyaetus audouinii* au banc d'Arguin, Gironde, en 2020. *Ornithos* 28-4: 277-278. • **GRANGÉ J.-L. & WENTWORTH A.** (2022). À propos de l'observation d'un Aigle ravisseur *Aquila rapax* dans les Pyrénées. *Ornithos* 29-1: 50-55. • **GUÉRIN B., BIGORNE J.-L. & GAUTIER L.** (2021). Première nidification avérée de la Chevêchette d'Europe *Glauclidium passerinum* en Lozère. *Ornithos* 28-3: 209-215. • **GUÉRIN B., MOLTO J., KARCZEWSKI G. & FONDERFLICK J.** (2017). Premier contact avec la Chevêchette d'Europe *Glauclidium passerinum* dans le Parc national des Cévennes. *Ornithos* 24-6: 358-361. • **GUÉRIN S., ROZEC X. & DUBOIS P.J.** (2018). Afflux et hivernage du Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* en Bretagne en 2016. *Ornithos* 26-1: 16-26. • **GUILLE K.** (2018). Une Bergeronnette printanière orientale *Motacilla flava* gr. *tshutschensis* en 2016 à Ouessant: première mention pour la France. *Ornithos* 25-6: 392-396. • **GUILPAIN J.-M. & VINCENT S.** (2018). Première mention française du Pouillot de Temminck *Phylloscopus coronatus*. *Ornithos* 25-2: 122-124. • **HABAS C.** (2022). Le Monticole bleu *Monticola solitarius* nicheur dans les Hautes-Pyrénées en 2021 et 2022. *Ornithos* 29-5: 334-335. • **HINDERMEYER X. & PENARD O.** (2019). Afflux exceptionnel de Puffins majeurs *Puffinus gravis* à l'île d'Yeu en novembre 2016. *Ornithos* 26-1: 27-35. • **ISAAC B.** (2020). Une Paruline à gorge orangée *Setophaga fusca* sur l'île d'Yeu en 2019: première mention pour la France. *Ornithos* 27-6: 390-392. • **ISSA N.** (2021). L'Élanion blanc *Elanus caeruleus* en France: Histoire d'une dynamique démographique. *Alauda* 89(1): 1-13. • **ISSA N. & MULLER Y.** (2015). *Atlas des oiseaux nicheurs de France métropolitaine. Nidification et présence hivernale. Volume 1: des Anatidés aux Alcidés*. Delachaux et Niestlé, Paris. • **ISSA N. & RÉVEILLAUD P.** (2018). Premier hivernage prolongé d'un Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni* en France. *Ornithos* 25-3: 176-178. • **JACKSON W.T.** (2021). Première mention française du Bruant à gorge blanche *Zonotrichia albicollis*. *Ornithos* 18-3: 190-193. • **JIGUET F.** (2020). Identifier le Gobemouche des Baléares *Muscicapa tyrrenica balearica* en France. *Ornithos* 27-2: 112-125. • **JIGUET F., CROCHET P.-A., PALOMARES V. & LE CHN** (2020). En direct du CHN. La Buse des steppes *B. b. vulpinus* en France: statut et identification. *Ornithos* 27-6: 355-371. • **JIGUET F., DE BROYER A., S. REEBER & LE CHN** (2019). En direct du CHN. La Locustelle lancéolée et la Locustelle de Pallas en France. *Ornithos* 26-4: 168-175. • **JORIS A.** (2020). Découverte d'un nid de Marouette de Baillon *Porzana pusilla* dans l'Aude en 2020. *Ornithos* 27-6: 393-396. • **KAYSER Y.** (2021). *Suivi de la reproduction de la Glaréole à collier – année 2020*. Tour du Valat, Arles. • **KAYSER Y., GAUTHIER-CLERC M., BLANCHON T., VANDEWALLE P., BEFELD S., PETIT J., TINÉ R., FLITTI A. & CHAMPAGNON J.** (2018). L'hivernage de la Grue cendrée *Grus grus* en Camargue: historique et statut récent. *Ornithos* 25-1: 4-13. • **LAPORTE O.** (2016). Séjour prolongé d'un Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* en Île-de-France: un premier hivernage probable. *Le Passer* 49-2: 70-71. • **LEBLANC J., OUDARD M. & ROUGERON A.** (2020). L'Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* nicheuse en Côte-d'Or: première mention pour la région Bourgogne-Franche-Comté. *Ornithos* 27-4: 280-282. • **LEFRANC N., BRUNET C. & SCHREIBER A.** (2017). Un couple mixte Pie-grièche à poitrine rose x Pie-grièche à tête rousse dans les Vosges. *Ornithos* 24-2: 108-117. • **LEGENDRE F.** (2017). Nouveaux cas de reproduction de l'Élanion blanc *Elanus caeruleus* en Lozère. *Ornithos* 24-4: 234-238. • **LEONCINI A.-S.** (2017). Premier cas avéré d'une reproduction en Corse du Fuligule milouin *Aythya ferina*. *Alauda* 85: 311. • **MAOUT J.** (2019). Le Courlis cendré *Numenius arquata* nicheur en Bretagne: une disparition inévitable? *Ornithos* 26-4: 153-167. • **MARION L.** (2021). Dixième recensement national des colonies de Héron cendré *Ardea cinerea* en France en 2014 et comparaison avec celui de 2007. *Alauda* 89(1): 29-46. • **MASSON R. & MASSON M.** (2019). Découverte de la Chevêchette d'Europe *Glauclidium passerinum* dans le Mâconnais. *Ornithos* 26-1: 52-55. • **MOUSSY C., QUAINTEGNE G. & GAUDARD C.** (2021). *Comptage des Oiseaux d'eau à la mi-janvier en France. Résultats 2021 du comptage Wetlands International*. LPO BirdLife France-Service Connaissance, Wetlands International, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Rochefort. • **NAPPÉE C.** (2008). Le Grand Tétràs *Tetrao urogallus* dans les Cévennes: histoire d'une réintroduction difficile. *Ornithos* 15-4: 282-293. • **OLIOSO G.** (2014). Expansion du Corbeau freux *Corvus frugilegus* dans le midi méditerranéen français. *Ornithos*

21-5: 249-253. • **OLIOSO G.** (2015). Statut historique et récent du Puffin fuligineux *Puffinus griseus* en Méditerranée occidentale. *Ornithos* 22-5: 264-269. • **OLIOSO G., CUGNASSE J.-M. & BOUTIN J.** (2003). Statut de la Niverolle alpine *Montifringilla nivalis* en période internuptiale en France. *Ornithos* 10-1: 12-23. • **OLIOSO G., THIBAUT J.-C., PIACENTINI J. & PONS J.-M.** (2019). Le Gobemouche tyrrhénien : nouvel endémique des îles de Méditerranée occidentale. *Ornithos* 26-2: 67-77. • **PIETTE J.** (2022). Nidification d'un Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* près de Dunkerque, Nord, en 2019. *Ornithos* 29-3: 184-187. • **PLESTAN M. & PROVOST S.** (2020). Première mention de la Sterne royale américaine *Sterna maxima maxima* pour la France. *Ornithos* 27-3: 196-199. • **POISSON O. & PROVOST R.** (2019). Afflux de sizerins en France lors de l'hiver 2017-2018 : analyse à l'aide du baguage. *Ornithos* 26-5: 209-231. • **PONS J.-M.** (2018). Premières mentions validées du Vautour de Rüppell *Gyps rueppelli* en France. *Ornithos* 25-1: 44-49. • **PONS J.-M. & LA CAF** (2020). En direct de la CAF. Le Grand Pingouin *Pinguinus impennis* en France au XIX^e siècle. *Ornithos* 27-5: 289-292. • **PONS J.-M. & LE GT CATÉGORIES** (2022). Les Vautours de Rüppell *Gyps rueppelli* observés en France sont-ils sauvages? *Ornithos* 29-2: 112-115. • **PONTARLIER H.** (2019). *Suivi de la reproduction et des populations nicheuses de rapaces en France – Bilan 2014 à 2018*. LPO-BirdLife France, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Rochefort. • **PRAMPART A.** (2021). L'hivernage du Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* en France métropolitaine. *Ornithos* 28-5: 281-295. • **PROVOST P.** (2017). Un Fou à pieds rouges *Sula sula* aux Sept-Îles, Côtes-d'Armor : deuxième mention française. *Ornithos* 24-5: 300-301. • **PUAUD T.** (2022). Hivernage d'une Fauvette babillarde « orientale » *Sylvia curruca blythi/halimodendri* en proche banlieue parisienne. *Le Passer* 55: 25-26. • **RECORBET B. & SIBLET J.-P.** (2018). Premier cas avéré de reproduction du Canard chipeau *Anas strepera* en Corse. *Alauda* 86: 305-307. • **REEBER S., CROCHET P.-A., DUBOIS P.J., DUFOUR P., JIGUET F., PIETTE J., PONS J.-M., VEYRUNES F. & WROZA S.** (2022). L'Érismaure à tête blanche *Oxyura leucocephala* en France : statut et catégorisation. *Ornithos* 29-3: 170-175. • **REY S.** (2021). Première mention française du Courlis hudsonien *Numenius hudsonicus* à Sein, Finistère, en 2020. *Ornithos* 28-5: 328-331. • **REY S. & DUQUET M.** (2021). Les observations tardives de martinets en France et en Europe de l'Ouest. *Ornithos* 28-2: 73-83. • **REY S. & YÉSOU P.** (2021). Effectif record de Puffins des Baléares *Puffinus mauretanicus* dans le Mor Braz en août 2020. *Ornithos* 28-2: 140-143. • **ROUSSEAU P., ROBIN F., DELAPORTE P., JOURDAN C. & BOCHER P.** (2021). Une Barge rousse *Limosa lapponica* hivernant en France migre jusqu'au Taïmyr. *Ornithos* 28-6: 367-371. • **ROUX P.** (2021). Un mâle de Busard pâle *Circus macrourus* participe à l'élevage de jeunes Busards cendrés *C. pygargus* en Champagne en 2020. *Ornithos* 28-3: 206-208. • **SABATIER G.** (2021). Une Paruline noir et blanc *Mniotilta varia* en 2019 sur l'île de Sein : première mention pour la France. *Ornithos* 28-4: 270-272. • **SALVI A.** (2017). La nidification de la Grue cendrée *Grus grus* en France. *Ciconia* 41(1-2): 57-69. • **SCHMALTZ L., QUAIN- TENNE G., GAUDARD C. & DALLOYAU S.** (2019). *Comptage des Oiseaux d'eau à la mi-janvier en France. Résultats 2019 du comptage Wetlands International*. LPO BirdLife France-Service Connaissance, Wetlands International, Ministère de la Transition écologique et solidaire, Rochefort. • **SEGUIN J.-F., CAVIGLIOLI J. & GOES F.** (2019). Premier cas d'hivernage d'Ibis chauve *Geronticus eremita* en Corse (France). *Alauda* 87(3): 255-257. • **SEGUIN J.-F., TORRE F., VILLARD P., RECORBET B. & THIBAUT J.-C.** (2017). Nouveau déclin de la répartition de la Sittelle corse *Sitta whiteheadi*. *Ornithos* 24-6: 323-334. • **THIOLLAY J.-M. & BRETAGNOLLE V.** (2004). *Rapaces nicheurs de France. Distribution, effectifs et conservation*. Delachaux et Niestlé, Paris. • **THIOLLAY J.-M. & TERRASSE J.-F.** (1984). *Estimation des effectifs de rapaces nicheurs diurnes et non rupestres en France, 1979-1982*. FIR-UNAO, Paris. • **THUREL J., RIOLS R., NADAL R., DENIS P. & RIOLS C.** (2013). L'Aigle botté *Aquila pennata* en France en 2012 : statut, répartition et effectifs. *Ornithos* 20-6: 333-343. • **TON L.** (2018). Un nouveau trio reproducteur de Pies-grièches à poitrine rose *Lanius minor* dans l'Hérault, en 2016. *Ornithos* 25-2: 118-120. • **TOUZÉ H.** (2019). Afflux record d'Étourneaux roselines *Pastor roseus* en France au printemps 2018. *Ornithos* 26-3: 105-119. • **TOUZÉ H. & MÉRIOT J.** (2017). Le Pipit de Richard *Anthus richardi* en hiver en France : statut et évolution récente. *Ornithos* 24-4: 224-233. • **TOUZÉ H., REEBER S. & LE CHN** (2020). Les oiseaux rares en France en 2018. 35^e rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 27-4: 201-235. • **TROTIGNON J.** (2021). Histoire d'un oiseau nicheur menacé en France : le Grèbe à cou noir *Podiceps nigricollis*. *Ornithos* 28-1: 1-27. • **TROTIGNON J.** (2022). Dénombrements des Butors étoilés *Botaurus stellaris* mâles chanteurs en France en 2021. *Ornithos* 29-1: 1-19. • **VÉRITÉ M.** (2021). Nidification de la Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* en 2020 dans les monts du Cantal. *Ornithos* 28-1: 64-69. • **WROZA S.** (2019). Le Gobemouche tyrrhénien *M. tyrrhenica* : un exemple de vocalisation extrême. *Ornithos* 26-2: 78-82. • **WROZA S.** (2020). Un Pouillot oriental *Phylloscopus orientalis* en 2017 dans l'Hérault : première mention française documentée de l'espèce. *Ornithos* 27-1: 68-71. • **WROZA S.** (2021). Première mention de la Paruline couronnée *Seiurus aurocapilla* en France métropolitaine. *Ornithos* 28-3: 202-205. • **WROZA S. & ROCHEFORT J.** (2022). Présence d'un Bec-croisé « d'Écosse » dans la forêt de Rambouillet, Yvelines. *Ornithos* 29-4: 240-243. • **WROZA S., ROCHEFORT J. & DALLET B.** (2018). Suivi acoustique d'un groupe de Becs-croisés perroquets *Loxia pytyopsittacus* hivernants. *Ornithos* 25-3: 162-168. • **YÉSOU P.** (2019). OrnithoScience. Tempêtes hivernales et échouages d'oiseaux marins en février 2014. • **ZUCCA M.** (2021). L'hivernage du Vanneau huppé et du Pluvier doré en Île-de-France et en France. *Ornithos* 28-6: 345-366.

Contact: Philippe J. Dubois (pjdubois@orange.fr) ■